

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

GENTOS® tablets
ГЕНТОС® таблетки

04

ИЗПОЛЗВАЕМА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Дистрибуция - Приложение 2

Разрешение № 11-13774, 31.05.2011

Освободен №

Прочетете листовката внимателно, защото тя съдържа важна информация за Вас.

Това лекарство е достъпно без рецепта. Въпреки това трябва да използвате GENTOS® таблетки внимателно, за да имате най-добрите резултати от него.

- Пазете тази листовка. Може би ще имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате нужда от повече информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако симптомите продължават или състоянието се влоши, задължително се консултирайте с лекар.
- Ако забележите нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка или отбелязаните нежелани лекарствени реакции станат сериозни, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представляват GENTOS® таблетки и за какво се използват
2. Каква информация трябва да имате преди да използвате GENTOS® таблетки
3. Как да приемате GENTOS® таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате GENTOS® таблетки
6. Допълнителна информация

1. Какво представляват GENTOS® таблетки и за какво се използват

GENTOS® таблетки хомеопатичен лекарствен продукт.

Показания:

Симптоматично лечение на остри и хронични заболявания на простатата, заболявания на пикочния мехур и смущения в уринирането.

В съответствие с хомеопатичната фармакологична природа на съставките, GENTOS® таблетки спомагат за облекчаване и лечение на следните симптоми:

Populus tremuloides	Увеличение на простатата и катарални цистити. Придружаващо лечение при катарални цистити. Спастична болка в областта на пикочния мехур след уриниране.
Serenoa repens	Аденом на простатата и нощно уриниране. Изпускане на капки урина при кашлица. Придружаващо лечение при простатити и епидидимити.
Conium maculatum	Увеличение на простатата. Често уриниране с изпускане на капки урина. Придружаващо лечение при цистити.
Kalium jodatum	Раздразнен пикочен мехур. Болезнено уриниране с никтурия. Придружаващо лечение при заболявания на тестисите и простатата.
Ferrum picricum	Сенилна хипертрофия на простата с чувство на тежест към дебелото черво. Болка в уретрата и парене.

2. Каква информация трябва да имате преди да използвате GENTOS® таблетки

Преди да предприемете лечение с GENTOS® таблетки се обърнете към вашия лекар за потвърждаване на диагнозата.

Не приемайте GENTOS® таблетки, ако сте алергични към активните или някоя от съставките на GENTOS® таблетки.



GENTOS® таблетки съдържа 226,7 mg лактоза за единична доза. Не се препоръчва при лица, страдащи от рядката наследствена болест галактозен интолеранс, липса на лактаза или глюкозо-галактозна малабсорция.

Ако страдате от заболяване на щитовидната жлеза, използвайте GENTOS® таблетки само след консултация с лекар.

Ако симптомите не се подобряват или не се достигат очакваните резултати приемайки GENTOS® таблетки, моля консултирайте се с Вашия лекар възможно най-скоро.

Прием на други лекарства

До сега не са известни взаимодействия с други лекарства.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включителни и такива, отпускани без рецепта.

Прием на GENTOS® таблетки с храна и течности

GENTOS® таблетки се приемат сублингвално (под езика) 30 минути преди или 1 час след храна за по-добър ефект.

Бременност и кърмене

Консултирайте се с вашия лекар или фармацевт преди да приемате каквото и да е лекарство. Поради липса на експериментални и клинични данни да се избягва употребата на GENTOS® таблетки по време на бременност и кърмене.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

GENTOS® таблетки няма влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате GENTOS® таблетки

Приемайте GENTOS® таблетки, съобразно инструкциите, описани в тази листовка. Моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

Доброкачествена хиперплазия на простатата

	Доза	Дозиране
Възрастни	1 таблетка	Първоначално продукта се приема 4 пъти дневно по 1 таблетка. След подобряване на състоянието приемите се редуцират на 2 пъти дневно за 3 месеца.

Простатит

	Доза	Дозиране
Възрастни	1 таблетка	Остър простатит: Първоначално продукта се приема 4 пъти дневно по 1 таблетка. След подобряване на състоянието приемите се редуцират на 2 пъти дневно за 3 месеца. Рецидивиращ простатит: Първоначално продукта се приема 4 пъти дневно по 1 таблетка. След подобряване на състоянието приемите се редуцират на 2 пъти дневно за 2 седмици.

Цистит и слабост на мехура

	Доза	Дозиране
Възрастни и юноши	1 таблетка	Цистит: Първоначално продукта се приема 4 пъти дневно по 1 таблетка, а деца от 1 до 12 години 4 пъти дневно по 1/2 таблетка. След подобряване на
Деца	1/2 таблетка	

		состоянието приемите се редуцират на 2 пъти дневно за 2 седмици. Слабост на мехура: Първоначално продукта се приема 4 пъти дневно. След подобряване на състоянието приемите се редуцират на 2 пъти дневно за 3 месеца.
--	--	--

Смущения в уринирането (изпускане, нощно уриниране, непълно уриниране)

	Доза	Дозиране
Възрастни и юноши	1 таблетка	Първоначално продукта се приема 4 пъти дневно по 1 таблетка, а деца от 1 до 12 години 4 пъти дневно по 1/2 таблетка. След подобряване на състоянието приемите се редуцират на 2 пъти дневно за 3 месеца.
Деца	1/2 таблетка	

GENTOS® таблетки се приемат сублингвално (под езика) 30 минути преди или 1 час след храна за по-добър ефект.

Ако сте приели повече от необходимата доза GENTOS® таблетки
Не са известни случаи на предозиране.

Ако сте пропуснали да вземете GENTOS® таблетки

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Вземете следващата доза, колкото е възможно по-скоро.

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Не са известни нежелани лекарствени реакции от GENTOS® таблетки.

Като всяко лекарство, GENTOS® таблетки, би могло да предизвика нежелани лекарствени реакции. Ако забележите нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате GENTOS® таблетки

Да се съхранява в оригиналната картонена опаковка с оглед предпазване от слънчева светлина, при температура под 30°C.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте GENTOS® таблетки след срока на годност, отбелязан на картонената опаковка и блистера. Датата на годност се отнася за последния ден на месеца.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържат таблетките GENTOS®

1 таблетка съдържа:

Populus tremuloides D1	25,0 mg
Serenoa repens D6	37,2 mg
Conium maculatum D6	37,2 mg
Kalium jodatum D12	37,2 mg
Ferrum picricum D12	37,2 mg

Помощни вещества: лактоза монохидрат, магнезиев стеарат, картофено нишесте.



Как изглежда GENTOS® таблетка като съдържание и опаковка

GENTOS® таблетка

Светло-жълтеникави, плоски, кръгли таблетки с делителна черта и специфичен вкус.
Опаковка: блистери от PVC/PVCD/ Al- фолио с по 20 и 40 таблетки.

Притежател на Разрешението за Употреба

Richard Bittner AG, Reisnerstraße 55-57; 1030 Vienna, Австрия

tel.: +43/(0)1-50 30 972

fax.: + 43/(0)1-50 30 972/40

e-mail: office.vienna@richard-bittner.com

Производител

Richard Bittner AG, Ossiacherstrasse 7, 9560 Feldkirchen, Австрия

tel.: +43/(0)4276-37888-0

fax.: +43/(0)4276-37131

e-mail: office@richard-bittner.com

Дата на последно одобрение на листовката

Март 2011

