

PIASCLEDINE® 300
ПИАСКЛЕДИН 300

ИМЕТО на Вашето лекарство е PIASCLEDINE®300, твърди желатинови капсули. Те се предлагат в кутии, съдържащи един или два блистера с 15 капсули.

СЪСТАВ – В една капсула се съдържа:

Лекарствени вещества: Avocado oil unsaponified 100.00 mg

Soybean oil unsaponified 200.00 mg

Помощни вещества: Безводен колоидален силициев двуокис (Aerosil) 7.00 mg

Бутилхидрокситолуол 0.03 mg

Капсулна обвивка: желатин, титанов двуокис, еритрозин, жълт железен окис.

В КОИ СЛУЧАИ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТОВА ЛЕКАРСТВО

В ревматологията: поддържащо лечение на остеоартритни болки

В стоматологията: поддържащо лечение при някои заболявания на венците.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Laboratoires EXPANSCIENCE

Rue des Quatre Filles, 28230 Epernon, France

ЦСЦ Фармасютикъл - България ЕООД

ул. А. Йорданов 10, София, България

ВНИМАНИЕ !

В КОИ СЛУЧАИ ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЛЕКАРСТВОТО


Piascledine не трябва да се предписва по време на бременност и кърмене

Прояви на свръхчувствителност към някоя от съставките на лекарствения продукт.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

При съмнение не се колебайте да поискате мнението на Вашия лекар или фармацевт.

PIASCLEDINE®300 принадлежи към новия клас SYSADOA (симптоматични, бавно действащи лекарствени продукти за остеоартрит), които се характеризират със забавено действие. Поради тази причина, може да бъде необходимо да се предпише



комбинация от НСПВС и/или аналгетици в началото на лечението с Piascledine, като дозата им се намалява с увеличаване на ефекта на Piascledine.

Помощното вещество Е 321 има дразнещ ефект върху очите, кожата и лигавицата.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

За да избегнете евентуални взаимодействия с други лекарствени продукти информирайте Вашия лекар или фармацевт за всяко друго провеждано лечение.

БРЕМЕННОСТ – КЪРМЕНЕ

Употребата на Пиаскледин не се препоръчва по време на бременност и кърмене.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ КОНЦЕНТРАЦИЯТА ПРИ ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Не оказва влияние.

КАК ДА СЕ ПРИЛАГА ЛЕКАРСТВОТО

Перорално. Една твърда желатинова капсула дневно по време на хранене.

Твърдата желатинова капсула се поглъща без да се дъвче с една голяма чаша вода.

КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ В СЛУЧАЙ НА ПРЕДОЗИРАНЕ

Уведомете Вашия лекар или фармацевт при поглъщане на по-голяма доза.

КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ В СЛУЧАЙ НА ПРОПУСКАНЕ НА ЕДНА ИЛИ НЯКОЛКО ДОЗИ

Продължете със следващата доза, както е нормално. НЕ ВЗЕМАЙТЕ повече капсули.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Като всеки активен продукт, това лекарство може да има при някои пациенти нежелани лекарствени реакции: оригвания, които могат да се избегнат като капсулата се взема по време на хранене.

Редки случаи на проява на свръхчувствителност към някоя от съставките на лекарствения продукт.

Много редки случаи на увеличени чернодробни ензими в кръвта (трансаминази, алкална фосфатаза и гама-глутамил транспептидаза).

УВЕДОМЕТЕ Вашия лекар или фармацевт за всяка нежелана лекарствена реакция, която не е спомената в настоящата листовка.



СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25°C (стайна температура)

СРОК НА ГОДНОСТ

Три години

ЛЕКАРСТВОТО ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ, ОТБЕЛЯЗАН НА ВЪНШНАТА ОПАКОВКА.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.

САМО ЛЕКАР МОЖЕ ДА ВИ ПРЕДПИШЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО

ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Декември, 2004 г.

