

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Флавамед® ефервесцентни таблетки  
60 mg ефервесцентни таблетки

Flavamed® Effervescent Tablets  
60 mg effervescent tablets

Амброксолов хидрохлорид (*ambroxol hydrochloride*)

**Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да приемате Флавамед® ефервесцентни таблетки.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 4-5 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представляват Флавамед® ефервесцентни таблетки и за какво се използват.....
2. Преди да приемете Флавамед® ефервесцентни таблетки.....
3. Как да приемате Флавамед® ефервесцентни таблетки.....
4. Възможни нежелани реакции.....
5. Как да съхранявате Флавамед® ефервесцентни таблетки.....
6. Допълнителна информация.....

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

20100495

Разрешение №

П - 10345 - 23. 07 2010

Одобрение №

### 1. Какво представляват Флавамед® ефервесцентни таблетки и за какво се използва

Флавамед® ефервесцентни таблетки се използва за лечение на влажна кашлица при заболявания на белия дроб и бронхите.

Флавамед® ефервесцентни таблетки втечнява бронхиалния секрет (мукус) и позволява по-лесното му отделяне чрез кашлица.

### 2. Преди да приемете Флавамед® ефервесцентни таблетки

**Не прилагайте Флавамед® ефервесцентни таблетки**

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество на Флавамед® ефервесцентни таблетки (амброксолов хидрохлорид) или към някоя от другите съставки на Флавамед® ефервесцентни таблетки (вижте точка 6, "Какво съдържа Флавамед® ефервесцентни таблетки").

- при деца под 12 години.

**Обърнете специално внимание при употребата на Флавамед® ефервесцентни таблетки**

- Ако сте имали много тежки кожни реакции на свръхчувствителност (синдром на Стивънс-Джонсън, синдром на Лайел);

• Синдром на Стивънс-Джонсън е заболяване с висока температура и обриви по кожата и лигавиците с образуване на мехури.

• Синдром на Лайел е животозастрашаващо състояние, известно още като синдром на попарената кожа. Признак е появата на големи мехури, подобно на изгаряне.

Ето защо, ако забележите промени по кожата и лигавиците, трябва веднага да спрете приема на Флавамед® ефервесцентни таблетки. Посетете незабавно лекар!

- Ако страдате от непоносимост към хистамин, трябва да избягвате продължителното лечение, тъй като активното вещество на Флавамед® ефервесцентни таблетки повлиява метаболизма на хистамин и може да доведе до симптоми на непоносимост (напр. главоболие, течаш нос, сърбеж).

- Ако страдате от нарушена бъбречна функция или от тежко чернодробно заболяване. В този случай Флавамед® ефервесцентни таблетки може да се прилагат само с особено внимание (напр. през по-дълги интервали или в намалена доза – консултирайте се с Вашия лекар за това). При тежко нарушена бъбречна функция може да настъпи натрупване на разпадни продукти на активното вещество на Флавамед® ефервесцентни таблетки.

- Ако страдате от рядко заболяване на бронхите с повишено образуване на мукус (напр. синдром на неподвижните реснички). Тогава мукусът не може да бъде отделен от белия дроб. В този случай Флавамед® ефервесцентни таблетки може да се прилага само под лекарско наблюдение.

- Ако сте имали пептична язвена болест, трябва да се посъветвате с Вашия лекар как да приемате Флавамед® ефервесцентни таблетки, защото муколитичите могат да раздразнят стомашната лигавица. Консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете Флавамед® ефервесцентни таблетки.

#### Деца

Флавамед® ефервесцентни таблетки може да се приема само от деца над 12 години.

#### **Прием на други лекарства**

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали някакви други лекарства, включително и такива, които се отпускат без рецепта.

#### *Лекарства, подтискащи кашлицата (антитусиви)*

По време на приема на Флавамед® ефервесцентни таблетки не трябва да приемате лекарства, които подтискат кашличния рефлекс (т. нар. антитусиви). Кашличният рефлекс е важен, за да може втечненият бронхиален секрет (мукус) да се откашля и по този начин да се отдели от белите дробове.

#### **Бременност и кърмене**

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

По време на бременност или кърмене може да приемате Флавамед® ефервесцентни таблетки само според точните указания на Вашия лекар!

До момента няма достатъчно опит при хора по време на бременност и кърмене. При животни обаче е наблюдавано, че активното вещество на Флавамед® ефервесцентни таблетки преминава в майчиното мляко.

#### **Шофиране и работа с машини**

Флавамед® ефервесцентни таблетки не повлиява или повлиява незначително способността за шофиране и работа с машини.

#### **Важна информация относно някои от съставките на Флавамед® ефервесцентни таблетки**

Този лекарствен продукт съдържа лактоза (млечна захар) и сорбитол (подсладител). Ако Вашият лекар Ви е уведомил, че страдате от непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди употребата на Флавамед® ефервесцентни таблетки.

Този лекарствен продукт съдържа 5,5 mmol (126,6 mg) натрий на ефервесцентна таблетка. Да се има предвид при пациенти, които са на диета с ограничен прием на натрий.

### **3. Как да приемате Флавамед® ефервесцентни таблетки**

Винаги приемайте Флавамед® ефервесцентни таблетки точно според указанията в тази листовка. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Освен ако лекар не Ви е предписал друго, трябва да се имат предвид следните указания за Флавамед® ефервесцентни таблетки. Моля, спазвайте указанията за приложение, защото в противен случай Флавамед® ефервесцентни таблетки може да не окаже очаквания ефект.

**Освен ако лекар не Ви е предписал друго, обичайната доза е:**

Възраст	Единична доза	Максимална дневна доза
Юноши над 12 години и възрастни	По ½ ефервесцентна таблетка 3 пъти дневно (еквивалентно на 3 пъти по 30 mg амброксолов хидрохлорид) по време на първите 2 до 3 дни, след което се продължава с ½ ефервесцентна таблетка два пъти дневно (еквивалентно на 2 пъти по 30 mg амброксолов хидрохлорид).	1½ ефервесцентни таблетки (еквивалентно на 90 mg амброксолов хидрохлорид)

**Забележка:**

При възрастни пациенти дневната доза може да бъде увеличена до една таблетка 2 пъти дневно.

Безопасността и ефикасността на Флавамед® ефервесцентни таблетки при деца под 12 годишна възраст все още не е установена.

#### **Начин на приложение**

Ефервесцентните таблетки се разтварят в чаша с вода и разтворът се приема след хранене. Ефервесцентните таблетки могат да бъдат разделени на две равни половини.

#### **Продължителност на приложение**

Флавамед® ефервесцентни таблетки не трябва да се прилага повече от 4-5 дни без консултация с лекар.

Ако оплакванията Ви не се повлияват след 4-5 дневно лечение или дори се влошават, посетете веднага лекар!

Моля, споделете с Вашия лекар или фармацевт, ако имате чувството, че ефектът на Флавамед® ефервесцентни таблетки е твърде силен или твърде слаб.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза Флавамед® ефервесцентни таблетки**

До момента не са наблюдавани сериозни симптоми на интоксикация. Възможни са временно безпокойство и диария.

При много голямо предозиране може да се появи повишено слюноотделяне, гадене, повръщане и спадане на кръвното налягане с нарушения на кръвообращението.

Консултирайте се с Вашия лекар! Спешни мерки като предизвикване на повръщане и стомашна промивка, обикновено не са необходими, освен при много голямо предозиране. Препоръчва се лечение в зависимост от проявените белези на предозиране.

#### **Ако сте пропуснали да приемете Флавамед® ефервесцентни таблетки**

или сте приели много малка доза, вземете лекарството в предписаната доза на следващия прием. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате допълнителни въпроси за приложението на този лекарствен продукт, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

#### 4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Флавамед® ефервесцентни таблетки може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

За оценка на нежеланите реакции се приема следната честота:

<b>Много чести</b>	засягат повече от 1 на 10 потребителя
<b>Чести</b>	засягат от 1 до 10 на 100 потребителя
<b>Нечести</b>	засягат от 1 до 10 на 1 000 потребителя
<b>Редки</b>	засягат от 1 до 10 на 10 000 потребителя
<b>Много редки</b>	засягат по-малко от 1 на 10 000 потребителя, неизвестни (честотата не може да се изчисли от наличните данни)

#### Нежелани лекарствени реакции

##### Стомашно-чревни нарушения

Нечести: гадене, стомашна болка, повръщане

##### Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много редки: тежки кожни реакции, като синдром на Лайел и синдром на Стивънс-Джонсън (вижте точка 2, “Обърнете специално внимание при употребата на Флавамед® ефервесцентни таблетки”).

##### Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Нечести: реакции на свръхчувствителност, като кожни реакции, лицев оток (едем), задух, сърбеж, висока температура.

Много редки: тежки алергични (анафилактични) реакции до шок.

#### Предпазни мерки

Ако забележите, че имате една или повече от гореизброените нежелани реакции, преустановете лечението с Флавамед® ефервесцентни таблетки веднага.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

#### 5. Как да съхранявате Флавамед® ефервесцентни таблетки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Не използвайте Флавамед® ефервесцентни таблетки след срока на годност, отбелязан върху етикета на тубата и картонената кутия след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 30°C!

Съхранявайте тубата плътно затворена, за да предпазите таблетките от светлина и влага.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### 6. Допълнителна информация

##### **Какво съдържа Флавамед® ефервесцентни таблетки**

Активното вещество е амброксолов хидрохлорид.

Една ефервесцентна таблетка съдържа 60 mg амброксолов хидрохлорид.

Другите съставки са:  
Лимонена киселина, безводна  
Натриев хидрогенкарбонат  
Натриев карбонат, безводен  
Захарин натрий  
Натриев циклаMAT  
Натриев хлорид  
Натриев цитрат  
Лактоза, безводна  
Манитол (Е 421)  
Сорбитол (Е 420)  
Аромат череша  
Симетикон


**Как изглежда Флавамед® ефервесцентни таблетки и какво съдържа опаковката**  
Кръгли, бели таблетки с делителна черта от едната страна.  
Ефервесцентната таблетка може да бъде разделена на две равни половини.  
Флавамед® ефервесцентни таблетки е в опаковки по 10 и 20 ефервесцентни таблетки.  
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

**Притежател на разрешението за употреба и производител**  
BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)  
Glienicke Weg 125  
D-12489 Berlin, Германия

**Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните-членки на ЕИП със следните имена**

България	Flavamed Effervescent Tablets
Чехия	Flavamed Effervescent Tablets
Дания	Flavamed Brusetabletter
Естония	Flavamed 60 mg
Финландия	Flavamed Effervescent Tablets
Германия	Flavamed 60 mg Brausetabletten
Латвия	Flavamed 60 mg putojošās tabletes
Литва	Flavamed 60 mg snypsciosios tabletes
Полша	Flavamed
Румъния	Flavamed Comprimate Efervescente
Словакия	Flavamed šumivé tablety
Словения	Flavamed 60 mg šumeče tablete

**Дата на последно одобрение на листовката**  
Март 2010 г.



- Ако страдате от непоносимост към хистамин, трябва да избягвате продължителното лечение, тъй като активното вещество на Флавамед® ефервесцентни таблетки повлиява метаболизма на хистамин и може да доведе до симптоми на непоносимост (напр. главоболие, течаш нос, сърбеж).

- Ако страдате от нарушена бъбречна функция или от тежко чернодробно заболяване. В този случай Флавамед® ефервесцентни таблетки може да се прилагат само с особено внимание (напр. през по-дълги интервали или в намалена доза – консултирайте се с Вашия лекар за това). При тежко нарушена бъбречна функция може да настъпи натрупване на разпадни продукти на активното вещество на Флавамед® ефервесцентни таблетки.

- Ако страдате от рядко заболяване на бронхите с повишено образуване на мукус (напр. синдром на неподвижните реснички). Тогава мукусът не може да бъде отделен от белия дроб. В този случай Флавамед® ефервесцентни таблетки може да се прилага само под лекарско наблюдение.

- Ако сте имали пептична язвена болест, трябва да се посъветвате с Вашия лекар как да приемате Флавамед® ефервесцентни таблетки, защото муколитичите могат да раздразнят стомашната лигавица. Консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете Флавамед® ефервесцентни таблетки.

#### Деца

Флавамед® ефервесцентни таблетки може да се приема само от деца над 12 години.

#### **Прием на други лекарства**

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали някакви други лекарства, включително и такива, които се отпускат без рецепта.

#### *Лекарства, подтискащи кашлицата (антитусиви)*

По време на приема на Флавамед® ефервесцентни таблетки не трябва да приемате лекарства, които подтискат кашличния рефлекс (т. нар. антитусиви). Кашличният рефлекс е важен, за да може втечненият бронхиален секрет (мукус) да се откашля и по този начин да се отдели от белите дробове.

#### **Бременност и кърмене**

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

По време на бременност или кърмене може да приемате Флавамед® ефервесцентни таблетки само според точните указания на Вашия лекар!

До момента няма достатъчно опит при хора по време на бременност и кърмене. При животни обаче е наблюдавано, че активното вещество на Флавамед® ефервесцентни таблетки преминава в майчиното мляко.

#### **Шофиране и работа с машини**

Флавамед® ефервесцентни таблетки не повлиява или повлиява незначително способността за шофиране и работа с машини.

#### **Важна информация относно някои от съставките на Флавамед® ефервесцентни таблетки**

Този лекарствен продукт съдържа лактоза (млечна захар) и сорбитол (подсладител). Ако Вашият лекар Ви е уведомил, че страдате от непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди употребата на Флавамед® ефервесцентни таблетки.

Този лекарствен продукт съдържа 5,5 mmol (126,6 mg) натрий на ефервесцентна таблетка. Да се има предвид при пациенти, които са на диета с ограничен прием на натрий.

### **3. Как да приемате Флавамед® ефервесцентни таблетки**

Винаги приемайте Флавамед® ефервесцентни таблетки точно според указанията в тази листовка. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Флавамед® ефервесцентни таблетки  
60 mg ефервесцентни таблетки

Flavamed® Effervescent Tablets  
60 mg effervescent tablets

Амброксолов хидрохлорид (*ambroxol hydrochloride*)

**Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да приемате Флавамед® ефервесцентни таблетки.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 4-5 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представляват Флавамед® ефервесцентни таблетки и за какво се използват.....
2. Преди да приемете Флавамед® ефервесцентни таблетки.....
3. Как да приемате Флавамед® ефервесцентни таблетки.....
4. Възможни нежелани реакции.....
5. Как да съхранявате Флавамед® ефервесцентни таблетки.....
6. Допълнителна информация.....

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА</b>	
Листовка - Приложение 2	20100495
Разрешение № П - 10345 / 23. 07. 2010	
Одобрение №	

### 1. Какво представляват Флавамед® ефервесцентни таблетки и за какво се използва

Флавамед® ефервесцентни таблетки се използва за лечение на влажна кашлица при заболявания на белия дроб и бронхите.

Флавамед® ефервесцентни таблетки втечнява бронхиалния секрет (мукус) и позволява по-лесното му отделяне чрез кашлица.

### 2. Преди да приемете Флавамед® ефервесцентни таблетки

#### **Не прилагайте Флавамед® ефервесцентни таблетки**

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество на Флавамед® ефервесцентни таблетки (амброксолов хидрохлорид) или към някоя от другите съставки на Флавамед® ефервесцентни таблетки (вижте точка 6, "Какво съдържа Флавамед® ефервесцентни таблетки").
- при деца под 12 години.

#### **Обърнете специално внимание при употребата на Флавамед® ефервесцентни таблетки**

- Ако сте имали много тежки кожни реакции на свръхчувствителност (синдром на Стивънс-Джонсън, синдром на Лайел);

• Синдром на Стивънс-Джонсън е заболяване с висока температура и обриви по кожата и лигавиците с образуване на мехури.

• Синдром на Лайел е животозастрашаващо състояние, известно още като синдром на попарената кожа. Признак е появата на големи мехури, подобно на изгаряне.

Ето защо, ако забележите промени по кожата и лигавиците, трябва веднага да спрете приема на Флавамед® ефервесцентни таблетки. Посетете незабавно лекар!



#### 4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Флавамед® ефервесцентни таблетки може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

За оценка на нежеланите реакции се приема следната честота:

<b>Много чести</b>	засягат повече от 1 на 10 потребителя
<b>Чести</b>	засягат от 1 до 10 на 100 потребителя
<b>Нечести</b>	засягат от 1 до 10 на 1 000 потребителя
<b>Редки</b>	засягат от 1 до 10 на 10 000 потребителя
<b>Много редки</b>	засягат по-малко от 1 на 10 000 потребителя, неизвестни (честотата не може да се изчисли от наличните данни)

#### Нежелани лекарствени реакции

##### Стомашно-чревни нарушения

Нечести: гадене, стомашна болка, повръщане

##### Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много редки: тежки кожни реакции, като синдром на Лайел и синдром на Стивънс-Джонсън (вижте точка 2, “Обърнете специално внимание при употребата на Флавамед® ефервесцентни таблетки”).

##### Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Нечести: реакции на свръхчувствителност, като кожни реакции, лицев оток (едем), задух, сърбеж, висока температура.

Много редки: тежки алергични (анафилактични) реакции до шок.

#### Предпазни мерки

Ако забележите, че имате една или повече от горезброените нежелани реакции, преустановете лечението с Флавамед® ефервесцентни таблетки веднага.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

#### 5. Как да съхранявате Флавамед® ефервесцентни таблетки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Не използвайте Флавамед® ефервесцентни таблетки след срока на годност, отбелязан върху етикета на тубата и картонената кутия след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 30°C!

Съхранявайте тубата плътно затворена, за да предпазите таблетките от светлина и влага.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### 6. Допълнителна информация

##### **Какво съдържа Флавамед® ефервесцентни таблетки**

Активното вещество е амброксолов хидрохлорид.

Една ефервесцентна таблетка съдържа 60 mg амброксолов хидрохлорид.

Освен ако лекар не Ви е предписал друго, трябва да се имат предвид следните указания за Флавамед® ефервесцентни таблетки. Моля, спазвайте указанията за приложение, защото в противен случай Флавамед® ефервесцентни таблетки може да не окаже очаквания ефект.

**Освен ако лекар не Ви е предписал друго, обичайната доза е:**

Възраст	Единична доза	Максимална дневна доза
Юноши над 12 години и възрастни	По ½ ефервесцентна таблетка 3 пъти дневно (еквивалентно на 3 пъти по 30 mg амброксолов хидрохлорид) по време на първите 2 до 3 дни, след което се продължава с ½ ефервесцентна таблетка два пъти дневно (еквивалентно на 2 пъти по 30 mg амброксолов хидрохлорид).	1½ ефервесцентни таблетки (еквивалентно на 90 mg амброксолов хидрохлорид)

**Забележка:**

При възрастни пациенти дневната доза може да бъде увеличена до една таблетка 2 пъти дневно.

Безопасността и ефикасността на Флавамед® ефервесцентни таблетки при деца под 12 годишна възраст все още не е установена.

#### **Начин на приложение**

Ефервесцентните таблетки се разтварят в чаша с вода и разтворът се приема след хранене.

Ефервесцентните таблетки могат да бъдат разделени на две равни половини.

#### **Продължителност на приложение**

Флавамед® ефервесцентни таблетки не трябва да се прилага повече от 4-5 дни без консултация с лекар.

Ако оплакванията Ви не се повлияват след 4-5 дневно лечение или дори се влошават, посетете веднага лекар!

Моля, споделете с Вашия лекар или фармацевт, ако имате чувството, че ефектът на Флавамед® ефервесцентни таблетки е твърде силен или твърде слаб.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза Флавамед® ефервесцентни таблетки**

До момента не са наблюдавани сериозни симптоми на интоксикация. Възможни са временно безпокойство и диария.


При много голямо предозиране може да се появи повишено слюноотделяне, гадене, повръщане и спадане на кръвното налягане с нарушения на кръвообращението.

Консултирайте се с Вашия лекар! Спешни мерки като предизвикване на повръщане и стомашна промивка, обикновено не са необходими, освен при много голямо предозиране. Препоръчва се лечение в зависимост от проявените белези на предозиране.

#### **Ако сте пропуснали да приемете Флавамед® ефервесцентни таблетки**

или сте приели много малка доза, вземете лекарството в предписаната доза на следващия прием. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате допълнителни въпроси за приложението на този лекарствен продукт, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.



Другите съставки са:  
Лимонена киселина, безводна  
Натриев хидрогенкарбонат  
Натриев карбонат, безводен  
Захарин натрий  
Натриев цикламат  
Натриев хлорид  
Натриев цитрат  
Лактоза, безводна  
Манитол (Е 421)  
Сорбитол (Е 420)  
Аромат череша  
Симетикон

**Как изглежда Флавамед® ефервесцентни таблетки и какво съдържа опаковката**  
Кръгли, бели таблетки с делителна черта от едната страна.  
Ефервесцентната таблетка може да бъде разделена на две равни половини.  
Флавамед® ефервесцентни таблетки е в опаковки по 10 и 20 ефервесцентни таблетки.  
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

**Притежател на разрешението за употреба и производител**  
BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)  
Glienicke Weg 125  
D-12489 Berlin, Германия

**Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните-членки на ЕИП със следните имена**

България	Flavamed Effervescent Tablets
Чехия	Flavamed Effervescent Tablets
Дания	Flavamed Brusetabletter
Естония	Flavamed 60 mg
Финландия	Flavamed Effervescent Tablets
Германия	Flavamed 60 mg Brausetabletten
Латвия	Flavamed 60 mg putojošās tabletes
Литва	Flavamed 60 mg snypsciosios tabletes
Полша	Flavamed
Румъния	Flavamed Comprimate Efervescente
Словакия	Flavamed šumivé tablety
Словения	Flavamed 60 mg šumeče tablete

**Дата на последно одобрение на листовката**  
Март 2010 г.