



ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**РОЗАЛГИН 500 mg гранули за вагинален разтвор**  
**ROSALGIN 500 mg granules for vaginal solution**  
**Бензидаминов хидрохлорид (Benzydamine Hydrochloride)**

*Моля прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.*

*Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.*

- *Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.*
- *Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, потийайте Вашия лекар или фармацевт.*
- *Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 10 дни.*
- *Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.*

**В тази листовка:**

1. Какво представлява РОЗАЛГИН и за какво се използва
2. Преди да приемете РОЗАЛГИН
3. Как да приемате РОЗАЛГИН
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате РОЗАЛГИН
6. Допълнителна информация

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РОЗАЛГИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

РОЗАЛГИН съдържа бензидаминов хидрохлорид като активно вещество.

Бензидаминът притежава изразени противовъзпалителни и болкоуспокояващи свойства. При локално приложение бензидамин прониква добре в кожата и повърхността на лигавицата и подобрява състоянието на възпалените тъкани.

РОЗАЛГИН се прилага при:

- Вулвовагинит и цервиковагинит от различен произход, включително вторични състояния след химио- и лъчетерапия.
- Пред и следоперативна профилактика при гинекологични операции.

**2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕТЕ РОЗАЛГИН**

**Не приемайте РОЗАЛГИН:**

- Ако сте алергични (свърчувствителни) към активното вещество бензидаминов хидрохлорид или към някоя от останалите съставки на РОЗАЛГИН.

**Обърнете специално внимание при употребата на РОЗАЛГИН**

Локалното приложение на РОЗАЛГИН не пречи на обичайните изследвания на тъканта.

При доказана причина за инфекцията (от бактерии, гъбички или други предизвикани от трихомонади възпаления на вагината) е необходимо допълване на лечението с РОЗАЛГИН със съответната терапия, насочена към причинителя.

### **Бременност и кърмене**

При употреба по предназначение е възможно използването на това лекарство при бременност и кърмене.

### **Шофиране и работа с машини**

Не оказва влияние.

### **Прием/употреба на други лекарства**

Не са познати взаимодействия с други вещества.

### **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ РОЗАЛГИН**

РОЗАЛГИН е предназначен за вагинални промивки.

Едно саше РОЗАЛГИН гранули се разтваря в ½ л. хладка вода.

Като вагинален душ за целта се използва обикновен дамски душ (например интимен душ РОЗАЛГИН), който се пълни с разтвора. Канюлата се поставя във вагината и съдържанието на бутилката се изпомпва докрай. След вливане на разтвора накрайникът се изважда от вагината.

Вагиналните промивки се правят под душа, но също така и върху тоалетната чиния или бидето.

Готовият разтвор може да се използва и без вагинален душ, за почистване на външните интимни части.

### **Колко често се прилага РОЗАЛГИН гранули?**

В общия случай се правят една до две вагинални промивки дневно, в продължение на 10 дни.

### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Продължителното използване на лекарствени продукти за вагинално приложение може да причини алергични реакции.

### **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ РОЗАЛГИН**

Не използвайте РОЗАЛГИН след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Да се пази от слънчева светлина.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

### **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

#### **Какво съдържа РОЗАЛГИН?**

1 саше съдържа:

Активно вещество: бензидаминов хидрохлорид (benzylamine hydrochloride) 500 mg

Другите съставки са: триметилцетиламониев паратолуенсулфонат, повидон и натриев хлорид.

#### **Как изглежда РОЗАЛГИН и какво съдържа опаковката**

РОЗАЛГИН се доставя в кутии с 5 или 10 сашета, с приложена листовка за пациента.

**Притежател на разрешението за употреба**

ЦСЦ Фармасютикъл ЛТД – България ЕООД, ул.“Асен Йорданов” 10, София 1592

**Производители:**

A.C.R.A.F. S.p.A., Via Vecchia del Pinocchio 22, 60131 - Ancona, Италия

ЦСЦ Фармасютикъл - България ЕООД, ул.“Асен Йорданов” 10, София 1592

*За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба*

**Дата на последно одобрение на листовката**

Септември 2009

