

# ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ по лекарствата

Листовка - Приложение 2

КИЕТЮД, сироп

QUIETUDE, syrop Ред. №

260.2104.95

Хомеопатичен лекарствен продукт

20316, 23.11.2012

Година №

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание при деца на 30 месечна възраст. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 3 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява КИЕТЮД, сироп, и за какво се използва?
2. Преди да приемете КИЕТЮД, сироп
3. Как да приемате КИЕТЮД, сироп?
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате КИЕТЮД, сироп?
6. Допълнителна информация

## 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КИЕТЮД, сироп, И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

КИЕТЮД, сироп, е хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван при деца над 1 година при случаи на нервност и при леки нарушения на съня.

## 2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ КИЕТЮД, сироп

**Не приемайте КИЕТЮД, сироп:**

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество(а) или към някоя от останалите съставки на КИЕТЮД, сироп.

**Обърнете специално внимание при употребата на КИЕТЮД, сироп**

**Този лекарствен продукт не трябва да се дава на деца под 30 месечна възраст без лекарско мнение.**

- Лекарствен продукт за деца над 1 година.
- Причините за нарушения на съня при деца изискват консултация с лекар. Необходимо е да се потърси и установи причината за нарушението на съня.



- Курсът на лечение трябва да бъде толкова кратък, колкото е възможно, и трябва да се прекрати след изчезването на симптомите. Ако симптомите не се повлият след три дни лечение, консултирайте се с вашия лекар.
- Ако вашият лекар ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.
- Този лекарствен продукт съдържа малки количества етанол (алкохол), по-малко от 100 mg в една доза.

#### **Прием на други лекарства**

Моля, информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или нас скоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецепт.

#### **Прием на КИЕТЮД, сироп, с храни и напитки**

Този лекарствен продукт трябва да се приема между храненията.

#### **Бременност и кърмене**

Консултирайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

#### **Шофиране и работа с машини**

Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Киетюд сироп е предназначен за деца.

#### **Важна информация относно някои от съставките на КИЕТЮД, сироп**

Списък на помощните вещества с доказан ефект: етанол, захароза.

### **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КИЕТЮД, сироп?**

Перорално приложение.

**Да не се дава на деца под 30 месечна възраст без лекарско мнение.**

**Лекарствен продукт за деца над 1 година.**

При преходна нервност и при леки нарушения на съня: да се взима по 1 доза от 5 ml от сиропа, измерена с мерителна чашка, сутрин и вечер.

Курсът на лечение трябва да се прекрати веднага след изчезване на симптомите и трябва да бъде възможно най-кратък.

Курсът на лечение трябва да се определи от лекуващия лекар при деца под 30 месечна възраст. Курсът на лечение не трябва да надвиши 10 дни при деца над 30 месечна възраст.

Ако симптомите продължават, лечението трябва да се преоценни.

**Ако сте приели повече от необходимата доза КИЕТЮД, сироп:**

Посъветвайте с вашия лекар или фармацевт.

**Ако сте пропуснали да приемете КИЕТЮД, сироп:**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.



#### **Ако сте спрели приема на КИЕТЮД, сироп:**

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте вашия лекар или фармацевт.

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, **КИЕТЮД, сироп**, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не са наблюдавани нежелани реакции.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете вашия лекар или фармацевт.

#### **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КИЕТЮД, сироп?**

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте **КИЕТЮД, сироп**, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

**КИЕТЮД, сироп**, може да се използва до 6 месеца след датата на първоначалното отваряне на бутилката.

#### **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

##### **Какво съдържа **КИЕТЮД, сироп**?**

Състав за 100 g

- Активните вещества са:

Chamomilla vulgaris (Лайка) 9 CH	.....	1,5 g
Gelsemium (Жълт жасмин) 9 CH	.....	1,5 g
Hyoscyamus niger (Черен бляян) 9 CH	.....	1,5 g
Kalium bromatum (Калиев бромид) 9 CH	.....	1,5 g
Passiflora incarnata (Страстоцвет) 3 DH	.....	1,5 g
Stramonium (Татул) 9 CH	.....	1,5 g

- Другите съставки са:

Захароза, етанол 96%, бензоева киселина, карамел, вода.

##### **Как изглежда **КИЕТЮД, сироп**, и какво съдържа опаковката?**

Сироп в бутилка от 200 ml с мерителна чашка.



**Притежател на разрешението за употреба и производител**

**Притежател на разрешението за употреба**

BOIRON  
20, rue de la Libération  
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon  
Франция

**Производител**

BOIRON  
2, avenue de l'Ouest Lyonnais  
69210 Messimy  
Франция

**Дата на последно одобрение на листовката: {ММ/ГГГГ}.**

