



## **Не се прилага при деца под 6 години без лекарско предписание.**

Уведомете Вашия лекар ако по време на лечението с ВИЗИН настъпи някое от следните събития:

- Развиете мидриаза (разширение на зеницата).
- Дразненето и зачервяването продължават или се засилват
- Имате болка в окото
- Настъпват промени в зрението Ви
- Прилагате лекарството повече от 72 часа.

### **Прием на други лекарства**

Не е известно ВИЗИН и някои други лекарства да си влияят едно на друго (взаимодействие).

### **Бременност и кърмене**

ВИЗИН не трябва да се прилага по време на бременност освен ако Вашият лекар не Ви е препоръчал друго.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да вземате каквото и да е лекарство, ако сте бременна.

Докато употребявате ВИЗИН, не се препоръчва да кърмите, тъй като не е известно дали ВИЗИН се излъчва в майчиното мляко.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да вземате каквото и да е лекарство, докато кърмите.

### **Шофиране и работа с машини**

Клиничният опит показва, че е малко вероятно ВИЗИН да наруши способността Ви за шофиране и работа с машини.

### **Важна информация относно някои от съставките на ВИЗИН**

Трябва да се избягва контакт с меки контактни лещи.

Помощното вещество, бензалкониев хлорид може да предизвика дразнене на окото. Контактните лещи трябва да се махнат преди да се използват очните капки и да се изчака поне 15 минути преди да се поставят отново. Може да се промени цвета на меките контактни лещи.

## **3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВИЗИН**

ВИЗИН е само за очно приложение.

При възрастни и деца над 6 години се поставят една или две капки в засегнатото око (очи) до 4 пъти дневно. За да се избегне замърсяване, върхът на контейнера не трябва да се допира до никаква повърхност.

Приложението при деца под 6 години трябва да се провежда само под наблюдението на лекар. Ако все още не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



### **Ако сте използвали повече от необходимата доза ВИЗИН**

Прекомерната употреба на това лекарство може да доведе до повишено зачервяване на окото.

### **Ако сте пропуснали да използвате ВИЗИН**

Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатото приложение.

## **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, ВИЗИН може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Обикновено ВИЗИН се понася добре и появата на нежелани реакции е малко вероятна, ако препаратът се прилага според указанията.

Много рядко може да възникнат следните нежелани реакции: парене в окото, дразнене на окото, болка в окото, зачервяване на окото, мидриаза.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

## **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВИЗИН**

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте в оригиналната опаковка.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Срок на годност след първо отваряне на бутилката – 4 седмици.

Не употребявайте след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Какво съдържа ВИЗИН**

ВИЗИН капки за очи, разтвор съдържа тетрахидрозолинов хидрохлорид.

Всеки ml от капките за очи съдържа 0.5 mg тетрахидрозолинов хидрохлорид.

Помощните вещества са: бензалкониев хлорид, борна киселина, натриев едетат, натриев хлорид, натриев борат, пречистена вода.

### **Как изглежда ВИЗИН и какво съдържа опаковката**

ВИЗИН е под формата на капки за очи.

ВИЗИН се предлага в опаковка, съдържаща 1 бутилка от 15 ml.

### **Притежател на разрешението за употреба**

McNeil Products Limited  
Foundation Park, Roxborough Way,  
Maidenhead, Berkshire SL6 3UG  
Великобритания



**Производител**

Janssen Pharmaceutica N.V.  
Turnhoutseweg 30  
2340 Beerse  
Белгия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

**България**

Представителство на Johnson & Johnson България ЕООД  
ж.к. Младост 4,  
Бизнес Парк София, сграда 4  
София 1715  
Тел.: 02 489 94 00

*Дата на последна редакция на листовката: 05/2011*

