

Информация за пациента

КЪМ РУ №: 11-5580 / 31.08.09

Одобрено: N=5 / 25-05-2009

Dentinox® 150 mg/3.4 mg/3.2 mg/ 1 g gel
 matricariae chamomilae tinctura/ lidocaine hydrochloride/ macrogol lauryl ether
 Дентинокс 150 mg/3.4 mg/3.2 mg/ 1 g гел
 тинктура лайка/ лидокаинов хидрохлорид/ макрогол лаурилетер

Зъбен гел за деца**Количествен и качествен състав**

1 g съдържа лекарствени вещества :

Matricariae tincture	150.0 mg
Lidocaine Hydrochloride 1H ₂ O	3.4 mg
Macrogol lauryl ether	3.2 mg

Лекарствена форма

Гел дентален.

Показания

ДЕНТИНОКС гел се прилага за облекчаване на болката и възпалението в периода на никнене на млечните зъби.

Противопоказания

Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Специални предупреждения при употреба

При наличие на инфекция, причинена от гъбички може да се наблюдава повишена резорбция на лидокаина, съдържащ се в ДЕНТИНОКС Гел .
 Не е препоръчително ДЕНТИНОКС Гел да се прилага в близост до очите.
 Етеричните масла, респективно ментол могат да причинят екзацербация на астма, бронхоспазъм, конвулсии, особено в по-високи дози.

Дозировка и начин на употреба

Ако не е предписано друго, когато се проявят първите белези на прорастване на зъбите, количество колкото грахово зърно ДЕНТИНОКС гел с чист пръст или памучен тампон се нанася и втрива с леки масажирани движения върху засегнатото място на венца.
 Процедурата трябва да се повтаря 2-3 пъти дневно след хранене и преди сън.



Приложението (при нужда) може да продължи до поникването на всички млечни зъби вкл. късните кътници.

В периода на никнене на млечните зъби ДЕНТИНОКС Гел може да се прилага с прекъсвания в продължение на няколко седмици.

Начин на действие

Лидокаин хидрохлорид облекчава бързо болката, възникнала при пробива на зъбите.

Полидоканол притежава продължителен обезболяващ ефект.

Тинктурата от лайка има противовъзпалително действие.

Приложението на ДЕНТИНОКС Гел облекчава болката и предотвратява дразненето и възпалението на венците, предизвикани от поникване на млечните зъби и късните кътници.

Предозиране

Поради ниската концентрация на активните съставки и малкото количество в опаковката, симптоми на предозиране не са наблюдавани. Няма съобщения за случаи на интоксикация

Взаимодействия с други лекарства

Не са известни.

Бременност и кърмене

ДЕНТИНОКС гел е локално прилаган продукт специално за малки деца.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма данни.


Нежелани реакции

Много рядко могат да бъдат наблюдавани алергични реакции напр. кожен обрив, локално дразнене и контактен дерматит, причинени от Лидокаина и Полидоканола, но и от други съставки на продукта. При локалното приложение на Лидокаин в устната и фарингеалната кухина може да се наблюдава затруднено гълтане. Много рядко може да бъде наблюдавана сънливост след употребата на ДЕНТИНОКС гел .

При интравенозното приложение на много високи дози Полидоканол може да се наблюдава хемолиза и парасимпатикови симптоми.

Помощни вещества:

Разтвор на сорбитол, ксилитол, пропиленгликол, карбомер 934 Р, полисорбат 20, натриев едетат, натриева основа, захарин натрий, ментол, пречистена вода



Съхранение:

Да се съхранява плътно затворен в опаковката при температура под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност :

5 години

Трайност след отваряне на тубата: 1 година.

Да не се използва след изтичане срока на годност, означен върху опаковката.

Данни за опаковката

Алуминиева туба с 10 g гел.

Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

Dentinox Gesellschaft

Für pharmazeutische Präparate

Lenk & Schuppan

Nunsdorfer Ring 19

D-12277 Berlin, Германия

Tel: +49 30 7200340 Fax: +49 30 72 11038

Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаване на партидата

Dentinox Gesellschaft

Für pharmazeutische Präparate

Lenk & Schuppan

Nunsdorfer Ring 19

D-12277 Berlin, Германия

Tel: +49 30 7200340 Fax: +49 30 72 11038

Без лекарско предписание.

Дата на последна редакция на листовката

Ноември 2007

