

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	2600094
Разрешение №	1-16553 / 26.01.2012
Одобрение №	

Листовка: Информация за потребителя

Zeel T, ointment
Зил Т, маз

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва
2. Преди да използвате Зил Т
3. Как да използвате Зил Т
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Зил Т
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Използва се при артроза /особено гонартроза/, полиартроза, спондилартроза, хумероскапуларен периартрит.

2. Преди да приемете Зил Т

- Не използвайте Зил Т ако имате свръхчувствителност към арника, отровен бръшлян и/или към някоя от другите съставки на лекарствения продукт.
- Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
- Употреба на Зил Т с храни и напитки – няма несъвместимости.
- Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Да не се използва по време на бременност и кърмене.
- Шофиране и работа с машини – Зил Т не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Зил Т

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Ако няма друго предписание, се нанася върху засегнатите места сутрин и вечер, напр. в областта на колянната става се втрива от маза лента с дължина 4-5 см.

- Употреба при деца – не е противопоказан.
- Ако сте използвали повече от обичайната доза – Зил Т няма доза на предозиране
- Ако сте пропуснали да използвате Зил Т, продължете по указаната схема.



- Ако сте спрели употребата на Зил Т – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4. Възможни нежелани реакции

Цетилстеарилалкохол може да предизвика локални кожни реакции (контактен дерматит). В много редки случаи може да предизвика реакция на свръхчувствителност и/или алергична кожна реакция.

5. Как да съхранявате Зил Т

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

Срок на годност – 3 години.

Срок на годност след отваряне на тубата – 12 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

- Какво съдържа Зил Т:

100 g съдържат:

Активни вещества:

Cartilago suis	D2	0,001 g
Funiculus umbilicalis suis	D2	0,001 g
Embryo suis	D2	0,001 g
Placenta suis	D2	0,001 g
Rhus toxicodendron	D2	0,27 g
Arnica montana	D2	0,3 g
Solanum dulcamara	D2	0,075 g
Symphytum	D8	0,75 g
Sanguinaria canadensis	D2	0,225 g
Sulfur	D6	0,27 g
Nadidum	D6	0,01 g
Coenzym A	D6	0,01 g
Acidum alpha-liponicum	D6	0,01 g
Natrium diethyloxalaceticum	D6	0,01 g
Acidum silicicum	D6	1 g

Помощни вещества:

Етанол 96%	9,565 g
Пречистена вода	60,810 g
Емулгиращ цетилстеарил алкохол (тип А)	8,007 g
Парафин, течен	9,342 g



Бял мек парафин

9,342 g

Консервиращо вещество: 12,8 об.% алкохол

- Как изглежда и какво съдържа опаковката: Туба, съдържаща 50 g маз
/ картонена кутия

- Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

- Дата на последно одобрение на листовката:

03.2011

