

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЕ**Канефрон 18 mg / 18 mg / 18 mg обвити таблетки**

Червен кантарион, стрък / Девисил, корен / Розмарин, лист

Canephron 18 mg / 18 mg / 18 mg coated tablets

Centaurii herba / Levistici radix / Rosmarini folium

Съобщение №

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Канефрон обвити таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Канефрон обвити таблетки
3. Как да приемате Канефрон обвити таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Канефрон обвити таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАНЕФРОН ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Традиционен растителен лекарствен продукт, който се използва като поддържащо лечение и в допълнение към специфични мерки, прилагани в случаи на леки оплаквания при възпалителни процеси на пикочните пътища и за предпазване от отлагане на пясък в бъбреците при възрастни и лица над 12 години.

Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ КАНЕФРОН ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ

Не приемайте Канефрон обвити таблетки



- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка б),
 - в случай на активни пептични язви,
 - в случай на нарушена бъбречная функция, - в случай на възпалителни заболявания на бъбреците.
- Консумация на големи количества течности са противопоказани в случаи на оток на долните крайници, поради нарушена сърдечна или бъбречная функция.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Канефрон обвити таблетки.

- Този лекарствен продукт не трябва да се приема от деца, по-малки от 12 години
- При случай на кръв в урината, при непрекъсната нужда от уриниране и остра задръжка на урина се налага незабавна консултация с лекар.

Ако след прием на Канефрон обвити таблетки оплакванията продължават или състоянието Ви се влоши моля, обърнете се към лекар.

Други лекарства и Канефрон обвити таблетки

Досега не са известни взаимодействия с други лекарства.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително такива, отпусканни без рецепт.

Бременност и кърмене

Моля, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Досега няма достатъчен опит за употребата на този лекарствен продукт по време на бременност и кърмене. Поради това Канефрон обвити таблетки не трябва да се използва при бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефекта върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Канефрон обвити таблетки

Този лекарствен продукт съдържа глюкоза, захароза и лактоза. Ако страдате от известна непоносимост към някои видове захари, консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете този лекарствен продукт.



3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КАНЕФРОН ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ

Винаги се придържайте към инструкциите в тази листовка: информация за потребителя, когато приемате Канефрон обвити таблетки. Ако не сте сигурни, в нещо консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако не е предписано друго, обичайната доза е:

Години	Единична доза 3 пъти дневно	Обща дневна доза
Лица над 12 години и възрастни	2 обвити таблетки	2 обвити таблетки 3 пъти дневно

Този лекарствен продукт не трябва да се приема от деца под 12 години.

Приемайте обвитите таблетки без да ги сдъвквате с достатъчно количество течност.

Необходимо е да приемате достатъчно количество течности по време на лечението.

Продължителността на лечението с този лекарствен продукт не е точно ограничена. Повече информация може да получите в раздел „Обърнете специално внимание при употребата на Канефрон обвити таблетки“.

Моля консултирайте се с Вашият лекар или фармацевт ако смятате, че ефекта от Канефрон обвити таблетки е много силен или много слаб.

Ако сте приели повече от необходимата доза Канефрон обвити таблетки

Не са известни случаи на предозиране с този лекарствен продукт. Ако сте приели по-голямо количество от необходимото, моля уведомете Вашия лекар. Той ще реши дали е необходимо да предприеме някакви мерки.

Ако сте пропуснали да приемете Канефрон обвити таблетки

Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Оценката на нежеланите лекарствени реакции се основава на следните възможни честоти на появяване:

Много чести:	наблюдавани при повече от 1 на 10 пациенти
Чести:	наблюдавани при по- малко от 1 на 10 пациенти
Нечести:	наблюдавани при по- малко от 1 на 100 пациенти



Редки:	наблюдавани при по- малко от 1 на 1,000 пациенти
Много редки:	наблюдавани при по-малко от 1 на 10,000 пациенти
С неизвестна честота	от наличните данни не може да бъде направена оценка

Много редки нежелани лекарствени реакции:

Свръхчувствителност/алергични реакции и стомашно-чревни нарушения (гадене, повръщане, диария).

Ако забележите тези нежелани лекарствени реакции, спрете веднага приемането на Канефрон обвити таблетки и се консултирайте с Вашия лекар.

Ако някои от нежеланите реакции станат сериозни, или забележите някакви нежелани лекарствени реакции неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КАНЕФРОН ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Не използвайте Канефрон обвити таблетки след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка или на блистера, след Годен до:. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашият фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Канефрон обвити таблетки

Активните вещества са:

1 обвита таблетка съдържа:

Червен кантарион, стрък (Centaurii herba)
Девисил, корен (Levisticum officinale radix)
Розмарин, лист (Rosmarini folium)

18 mg;
18 mg;
18 mg



Помощните вещества са:

Ядро: лактоза монохидрат, магнезиев стеарат, царевично нишесте, повидон К 25, силициев диоксид, колоиден безводен; **обвивка:** калциев карбонат, рициново масло, глюкозен сироп (изсушен), червен железен оксид (Е-172), царевично нишесте, декстрин, воськ, повидон К 30, рибофлавин (Е-101), шеллак, захароза, талк, титанов диоксид (Е-171).

Как изглежда Канефрон обвити таблетки и какво съдържа опаковката

Кръгли, двойно изпъкнали, оранжево оцветени обвити таблетки с гладка повърхност.

Произвеждат се следните опаковки съдържащи 60, 120 и 200 обвити таблетки.

Не всички опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Допълнителна информация:

Една Канефрон обвита таблетка съдържа около 0,020 хлебни единици (BU).

Притежател на разрешението за употреба и производител

BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
92318 Neumarkt
Германия
Tel: 09181 / 231-90
Fax: 09181 / 231-265
Internet: www.bionorica.de
email: info@bionorica.de

Медицинско представителство в България:

Бионорика България ЕООД
София 1000, бул. Христо Ботев № 12, ет.1
тел: 0885189691

Дата на последно преразглеждане на листовката: октомври 2012 г.

