

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. № ..... 20/10/33	
Разрешение № ..... 182/14	09.07.2012
Одобрение № ..... /	

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**PANADOL ОПТИЗОРБ 500mg film-coated tablets**  
**ПАНАДОЛ ОПТИЗОРБ 500mg филмирани таблетки**

Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАНАДОЛ Оптизорб И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Панадол Оптизорб 500mg филмирани таблетки е обезболяващо и температуропонижаващо средство и се използва за симптоматично лечение на повечето състояния, свързани с лека до умерена болка и висока температура, напр. главоболие, включително мигрена, зъббол, болки в гърба, ревматични и мускулни болки, менструални болки, болки при възпалено гърло.

#### Как действа ПАНАДОЛ Оптизорб?

Панадол Оптизорб 500mg филмирани таблетки съдържа парациетамол – аналгетик (болкоуспокояващо) и антипиретик (понижава температурата). Панадол Оптизорб 500mg филмирани таблетки не дразни стомаха и таблетките са с форма на капсула, което улеснява тяхното прегъщане.

Панадол Оптизорб 500mg филмирани таблетки съдържа система за разпадане на таблетката, която ускорява разтварянето и така осигурява поне с 37% по-бързо начало на действието, сравнено със стандартни таблетки с парациетамол.

### 2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ ПАНАДОЛ Оптизорб

**Запомнете: ПАНАДОЛ Оптизорб съдържа парациетамол.**

**Не приемайте с други лекарства, съдържащи парациетамол.**

**Не взимайте Панадол Оптизорб, ако сте алергични към парациетамол или някоя от другите съставки.**

**Съдържа парахидроксибензоати, които могат да причинят алергична реакция.**

**Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да вземете ПАНАДОЛ Оптизорб, ако:**

- имате бъбречно или чернодробно заболяване;
- взимате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повръщане) или холестирамин, прилаган за понижаване нивото на холестерин;
- взимате антикоагуланти – лекарства, използвани за разреждане на кръвта;
- трябва да взимате обезболяващо средство всеки ден за продължителен период;



- сте имали проблем с дишането при употреба на това или подобно лекарство в миналото;
- сте бременна или кърмите.

#### **Бременност и кърмене**

Епидемиологичните проучвания при бременност при човека не показват риск при употребата на парацетамол в препоръчените дози.  
Парацетамол се екскретира в майчиното мляко, но не в клинично значими количества.  
Наличните данни не показват, че парацетамол е противопоказан по време на кърмене.

#### **3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ Оптизорб?**

##### **За перорално приложение.**

**Възрастни, включително и тези над 60 години, и деца на и над 12 години:**  
**2 (две) таблетки на всеки 4 часа при необходимост. Не взимайте на интервали по-кратки от 4 часа и не надвишавайте 8 таблетки (4000mg парацетамол) за период от 24 часа.**

**Деца (от 6 до 12 години) – ½ (половин) до 1 (една) таблетка да се дава на всеки 4 часа при необходимост. Не трябва да се дават повече от 4 (четири) таблетки за 24 часа.**

**Не давайте на деца повече от 3 (три) дни без консултация с лекар.**

**Да не се дава на деца под 6 годишна възраст.**

**Ако симптомите се запазят, консултирайте се с Вашия лекар.**

**Да не се превишава препоръчената доза.**

##### **Какво трябва да направите, ако приемете прекалено много?**

Приемането на прекалено голямо количество може да увреди черния дроб. Ако вземете повече от препоръчената доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре.

##### **Какво трябва да направите ако забравите или сте пропуснали да приемете необходимата доза?**

Приемете дозата когато си спомните. Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Макар и рядко е възможна появата на промени в кръвната картина. Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако:

- наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, появява на оток по устните, езика, гърлото или лицето;
- се появят язви в устата;
- сте имали проблеми с дишането при употреба на ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарства;
- имате неочаквано кървене или склонност към насиняване.

#### **5. СЪХРАНЕНИЕ НА ПАНАДОЛ Оптизорб**

**Да се пази на място, недостъпно за деца.**



**Да се съхранява при температура под 30°C.**

**Не използвайте след датата, посочена на опаковката.**

**Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.**

**Не изхвърляйте лекарства с битовите отпадъци или в канализацията. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните лекарства и така ще спомогнете за опазване на околната среда.**

## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

**Какво съдържа ПАНАДОЛ Оптизорб?**

**Всяка таблетка съдържа парацетамол 500mg**

**Също така съдържа прежелатинизирано нишесте, калциев карбонат, алгинова киселина, кросповидон, повидон, магнезиев стеарат, колоиден безводен силициев диоксид и натриев метил (E219), натриев етил (E215) и натриев пропил (E217) паракидроксибензоат.**

**За таблетната обвивка: опадри бял, карнауба восък, дестилирана вода.**

**Как изглежда ПАНАДОЛ Оптизорб и какво съдържа опаковката?**

**Панадол Оптизорб са бели до леко кремави филмирани таблетки с формата на капсула с гладки ръбове, релефно „Р” в кръг от едната страна и с делителна черта от другата.**

**Опаковката може да съдържа 12, 16, 24, 30 или 32 таблетки.**

**Притежател на разрешението за употреба и производител**

**Притежател на разрешението за употреба е:**

**GlaxoSmithKline Consumer Healthcare**

**GlaxoSmithKline Export Ltd.**

**Brentford, TW8 9GS, Обединено кралство**

**Производители:**

**GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.,**

**Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Ирландия**

**и/или**

**GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG**

**71083 Herrenberg, Германия**

**и/или**

**Catalent UK Packaging Ltd.,**

**Sedge Close, headway, Great Oakley, Corby**

**Northamptonshire, Обединено кралство**

**и/или**

**S.C. EUROPHARM S.A.**

**2 Panseteelor St., Brasov 500419, Румъния**

**Срок на годност – 3 години.**

**Без лекарско предписание.**

**Последна актуализация – август 2011**

**GSK logo**

**Panadol\* е регистрирана търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies**

