

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ТАНТУМ ВЕРДЕ с вкус на портокал и мед 3 mg таблетки за смучене
Бензидаминов хидрохлорид

TANTUM VERDE with orange-honey flavor 3 mg lozenges
Benzydamine hydrochloride

Моля прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашето състояние се влошава или не се подобрява след 7 дни.

- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Тантум Верде таблетки за смучене и за какво се използва
2. Преди да приемете Тантум Верде таблетки за смучене
3. Как да приемате Тантум Верде таблетки за смучене
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тантум Верде таблетки за смучене
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТАНТУМ ВЕРДЕ ТАБЛЕТКИ ЗА СМУЧЕНЕ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Тантум Верде са таблетки за смучене, съдържащи активното вещество бензидаминов хидрохлорид. Бензидаминовият хидрохлорид притежава изразени противовъзпалителни и болкоуспокояващи свойства. Въз основа на бързото проникване и локалното натрупване във възпалената тъкан се стига до бързо затихване на симптомите.

Тантум Верде е с добра локална поносимост и води до целенасочена терапия на възпалителните симптоми и на оплакванията при преглъщане.

Тантум Верде се прилага при болезнени възпаления в устната кухина и гърлото, възпаления на венците, на сливиците, възпаления на лигавицата на гърлото и на ларинкса. Особено подходящ е за намаляване на оплакванията при простудни заболявания.

Не съдържа захар.

БЕЗ ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ ТАНТУМ ВЕРДЕ ТАБЛЕТКИ ЗА СМУЧЕНЕ

Не приемайте Тантум Верде таблетки за смучене



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20110377
Разрешение №	17078 / 12.03.2012
Одобрение №	

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към бензидамин или към някоя от останалите съставки;
- ако сте алергични към аспирин или други нестероидни противовъзпалителни средства.

Обърнете специално внимание при употребата на Тантум Верде таблетки за смучене

Повишено внимание е необходимо при пациенти с бронхиална астма, тъй като е възможно развитие на бронхоспазми при тази група пациенти.

Употреба на други лекарства

Не се очакват взаимодействия на Тантум Верде таблетки за смучене с други лекарства, въпреки това, ако не сте сигурни, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт в случай, че приемате други лекарства, включително и такива, отпускани без лекарско предписание.

Бременност и кърмене

Вие трябва да се обърнете към Вашия лекар или фармацевт, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите.

Той/тя ще реши дали може да приемате Тантум Верде таблетки за смучене.

Важна информация относно някои от съставките на Тантум Верде таблетки за смучене

Продуктът съдържа изомалт (вид захар). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този продукт.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ТАНТУМ ВЕРДЕ ТАБЛЕТКИ ЗА СМУЧЕНЕ

Ако лекарят не е предписал нещо друго, дозировката трябва да се спазва точно - 3 пъти дневно по една таблетка за смучене. Таблетката се оставя бавно да се разтопи в устата.

Лечението не трябва да превишава период от 7 дни.

Поради лекарствената му форма – таблетки за смучене, прилагането на лекарствения продукт при деца под 6 години не се препоръчва. Приложението при деца между 6 и 11 години да бъде под наблюдението на възрастен.

Ако след употреба на Тантум Верде таблетки за смучене не настъпи очаквания ефект от лечението, се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Тантум Верде таблетки за смучене

Ако случайно сте взели повече от препоръчаната доза таблетки, Вие трябва да се свържете с Вашия фармацевт, лекар или с най-близката болница. Винаги носете с Вас опаковка от лекарството, независимо от това дали са останали таблетки в нея или не.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Като всички лекарства Тантум Верде таблетки за смучене може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Алергични реакции се наблюдават рядко, но могат да бъдат сериозни. Незабавно потърсете Вашия лекар, ако внезапно усетите подуване в устата или гърлото, затруднено дишане, обрив или сърбежи, особено ако е засегнато цялото тяло.



В единични случаи след употреба на таблетките за смучене може да се появи леко парене на лигавицата на устната кухина или сухота в устата. Ако това се случи с Вас, изпийте чаша вода на гълтки, за да намалите ефекта.

Рядко наблюдавана реакция след системна употреба на бензидамин е светлочувствителността.

Има съобщение за единичен случай на анафилактични реакции.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ТАНТУМ ВЕРДЕ ТАБЛЕТКИ ЗА СМУЧЕНЕ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 30°C.

Лекарственият продукт да се съхранява в оригиналната опаковка.

Не използвайте Тантум Верде таблетки за смучене след датата на изтичане на срока на годност, отбелязана върху опаковката.

Срокът на годност изтича на последния ден от посочения месец.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Тантум Верде таблетки за смучене?

Активно вещество: бензидаминов хидрохлорид (benzydamine hydrochloride) 3 mg, еквивалентен на 2.68 mg бензидамин.

Помощни вещества: изомалт (E 953), лимонена киселина монохидрат, вкус на портокал, вкус на мед, левоментол, ацесулфам калий, хинолиново жълто (E104), сънсет жълто (E110).

Как изглежда Тантум Верде таблетки за смучене и какво съдържа опаковката?

Тантум Верде таблетки за смучене са жълто-оранжеви, с квадратна форма таблетки, всяка от които е обвита в хартия.

Всяка кутия съдържа 20, 30 или 40 таблетки за смучене с приложена листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба

ЦСЦ Фармасютикъл Лтд – България ЕООД, бул. „Асен Йорданов“ 10, 1592 София,
България
Тел: (02) 975 13 95
Факс: (02) 971 57 45

Производител на лекарствения продукт

A.C.R.A.F. S.p.A., Via Vecchia del Pinocchio 22, 60131- Ancona, Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

Дата на последно одобрение на листовката:

01/2012

