

Информация за пациента

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	9700294
Разрешение №	12768 / 06.04.2012
Одобрение №	/

Revalid® capsules, hard
Ревалид капсули, твърди

Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Този лекарствен продукт се предлага без рецепта. Въпреки това Вие трябва да приемате Ревалид внимателно, за да постигнете добри резултати.

- Пазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
- Обърнете се към Вашия лекар, ако Вашите симптоми се влошат или не се подобрят след 3 месеца.
- Ако някои от нежеланите реакции станат сериозни или забележите нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Каква информация съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Ревалид и за какво се използва?
2. Преди да приемете Ревалид
3. Как да приемате Ревалид?
4. Нежелани реакции
5. Как трябва да се съхранява Ревалид?
6. Друга информация

1. Какво представлява Ревалид и за какво се използва?

Ревалид съдържа витамини, аминокиселини и микроелементи, които са естествена съставка на храната.

Активните съставки на Ревалид подпомагат формирането на кератина- основен градивен материал на косата и ноктите.

Ревалид оказва благоприятно въздействие върху еволюцията на алоpecia: може да спре частично или намали загубата на коса.

Ревалид прави ноктите по-малко чупливи.

Ревалид се използва за лечение на следните симптоми:

- Алоpecia от различен произход, респ. дифузна алоpecia, андрогенна алоpecia, себорейна алоpecia, алоpecia вследствие на болест или бременност, алоpecia вследствие лечение с медикаменти, хормонална алоpecia след изясняване и лечение на специфичното заболяване или нарушение.
- Косопад и нарушения в растежа на косъма от различен произход
- Нарушена структура на косъма (чупливост, разцепване на косъма, изтощена коса)
- Нарушения в растежа и дистрофии на ноктите

За андрогенната алоpecia и alopecia areata, ефекта на Ревалид е ограничен само до укрепване и заздравяване на останалата коса.



2. Преди да приемете Ревалид

Смущенията в състоянието на косата често пъти са утежнени поради дисбаланс в храненето. По възможност трябва да се приема добре балансирана и разнообразна храна. Строго ограничаващи диети като вегетарианска или изключително ниско калорична е желателно да се избягват, както и агресивно третиране на косата: изрусяване, много често боядисване, студено къдрене, прекалена употреба на шампоан, горещо изсушаване, опъната прическа, къдрене с маша, продължително и незащитено излагане на слънце.

Носенето на гумени ръкавици предпазва ноктите от агресивността на домашната работа

Не приемайте Ревалид

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към някои от активните съставки или помощните вещества.

Предвид липсата на достатъчно данни Ревалид не трябва да се използва при деца под 12 години.

Прием на други лекарства

Ревалид не трябва да бъде приеман по време на лечение със сулфонамиди, тъй като действието на сулфонамидите се подтиска от парааминобензоената киселина.

Моля уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или напоследък сте приемали други лекарства, вкл. лекарства без рецепта.

Бременност и кърмене

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете лечение с Ревалид, ако сте бременна или кърмите.

Шофиране и работа с машини

Ревалид няма негативно въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Ревалид

Информация за диабетици: 1 капсула = 0.035 плодов еквивалент (6, 7 kJ/1, 6 kcal).

Информация за пациенти с цъолиакия: 1 капсула съдържа 1 mg глутен.

3. Как да приемате Ревалид ?

Винаги приемайте дозата, препоръчана в тази листовка. Ако не сте сигурни относно употребата на Ревалид консултирайте се с Вашия фармацевт.

Обичайната доза за възрастни и деца над 12 години е една капсула 3 пъти дневно с достатъчно течност, след или по време на хранене.

Въпреки благоприятните резултати, които често се наблюдават още след първия месец от лечението, терапията с Ревалид трябва да продължи три месеца. Лечението може да бъде продължено или повторено при необходимост.



При тежки случаи, лечението може да започне с по-висока доза - 2 капсули три пъти дневно през първия месец и след това да се продължи с нормалната доза от 1 капсула три пъти дневно.

Ако сте приели повече капсули отколкото е необходимо или ако сте пропуснали прием на Ревалид

В случай че пропуснете един прием или леко предозирате, можете да продължите лечението без промяна. Не приемайте двойна доза.

Ако имате впечатление, че ефектът от Ревалид е прекалено слаб или прекалено силен, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

4. Нежелани лекарствени реакции

Както всеки лекарствен продукт Ревалид може да предизвика нежелани реакции. В случай на прием на Ревалид между храненията или на празен стомах, може да се наблюдава гадене или лек гастро - интестинален дискомфорт. В тези случаи стриктно се спазва препоръчания начин на прием.

При дозировка от 6 капсули дневно би могло да се почувства лек дигестивен дискомфорт. В тези случаи е необходимо да бъде приложена дозировка от 3 капсули дневно. Все пак Ревалид се понася добре.

Ако някои нежелани реакции са сериозни или забележите такива, които не са споменати в тази листовка, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. Как трябва да се съхранява Ревалид ?

Да се съхранява на сухо място при температура под 25° C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Ревалид след срока на годност, отбелязан на опаковката и блистера.

Срока на годност се отнася до последния ден на посочения месец. Партидният номер е отбелязан на блистера.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Друга информация

Какво съдържа Ревалид?

1 капсула съдържа:

100 mg метионин, 50 mg цистеин, 50 mg калциев пантотенат, 1,5 mg тиаминхидрохлорид (Vit B 1), 10 mg пиридоксинхидрохлорид (VitB6), 20 mg парааминобензоена киселина, 50 mg екстракт от просо, 50 mg екстракт от пшенични зародиши, 50 mg бирена мая, 2 mg желязо, 2 mg цинк и 0,5 mg мед;

помощни вещества: оцветител (Е 104), безводен колоидален силиций, желатин

Данни за опаковката:

Опаковка от 30 и 90 капсули

Срок на годност: 3 години



Име и адрес на производителя

Movianto Česká republika, a.s.

Podolí 78e

664 03 Podolí

Чехия

Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

Ewopharma International s.r.o., 831 01 Bratislava, Словакия

За повече информация относно този лекарствен продукт се обърнете към локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Евофарма – гр. София, ул. „Персенк“ 73, ет.8, ап.27

Дата на последна редакция:

Септември 2011г.

