

ТАНТУМ ВЕРДЕ® 0,15 % спрей за устна лигавица
TANTUM VERDE® 0,15 % oromucosal spray
Бензидаминов хидрохлорид (Benzydamine Hydrochloride)

Моля прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 7 дни.

- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей и за какво се използва
2. Преди да използвате ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей
3. Как да използвате ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТАНТУМ ВЕРДЕ СПРЕЙ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей съдържа активното вещество бензидаминов хидрохлорид. Бензидаминът притежава изразени противовъзпалителни и болкоуспокояващи свойства. Въз основа на бързото проникване и на локалното натрупване във възпалената тъкан се стига до бързо отслабване на болките и оплакванията при преглъщане.

ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей се прилага при болезнени възпаления на устната кухина, венците и гърлото, както и при инфекции на лигавицата на устната кухина и гърлото, най-вече при простудни заболявания.

Прилага се преди и след вадене на зъб.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАНТУМ ВЕРДЕ СПРЕЙ

Не използвайте ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество бензидамин или към някоя от останалите съставки на ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей.

Обърнете специално внимание при употребата на ТАНТУМ ВЕРДЕ СПРЕЙ

При продължаване на оплакванията или ако не се появи очакваното въздействие, потърсете лекарска консултация при първа възможност.

Неволното поглъщане на малки количества от лекарството е безопасно. Ако големи количества се погълнат по грешка (напр. от деца), незабавно да се потърси лекарска помощ. Като мярка за първа помощ се препоръчва предизвикването на повръщане.

Прием/употреба на други лекарства

Не са познати взаимодействия с други лекарства.

Бременност и кърмене

Tantum Verde 0,15 % spray
01/2014

При употреба по предназначение е възможно използването на това лекарство при бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей не оказва влияние върху концентрацията при шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАНТУМ ВЕРДЕ СПРЕЙ

ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей е предназначен за впръскване в устната кухина и гърлото.

Да не се прилага при деца на възраст под 30 месеца.

Поради съдържание на ментол, продуктът не се препоръчва за приложение при деца под 5 годишна възраст.

В общия случай ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей се използва 2-6 пъти дневно.

За възрастни: 4-8 впръсквания; за деца между 6 и 12 години: 4 впръсквания.

Указания за ползване:

1. Повдигнете дюзата на помпата.
2. Поставете дюзата в устата и насочете към засегнатото място.
3. С показалец натиснете бутона на помпата.

Преди първата употреба на ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей трябва да натиснете няколко пъти, докато се появи аерозолен облак.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Непосредствено след употреба може да се появи изтръпване в устата и гърлото. Този ефект спада към начина на действие на лекарствения продукт и след кратко време отшумява.

В много редки случаи след употребата на ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей може да се появи леко парене на лигавицата на устната кухина, неразположение или повръщане.

При употреба не по предназначение (напр. гълтане на големи количества ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей), като нежелани реакции могат да се появят смущения в съня, безпокойство, премрежване пред очите, поява на снежинки. Тези реакции отшумяват от само себе си.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване: Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТАНТУМ ВЕРДЕ СПРЕЙ

Не използвайте ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей след срока на годност, отбелязан на опаковката.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей

100 ml разтвор съдържат:

Активно вещество: бензидаминов хидрохлорид 0,15 g.

Другите съставки са: етанол 96 %, глицерол, метил парахидроксибензоат, ментов аромат, захарин, натриев хидрогенкарбонат, полисорбат 20, пречистена вода.

Как изглежда ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей и какво съдържа опаковката

ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей се предлага в полиетиленова бутилка, съдържаща 30 ml разтвор, поставена в картонена кутия с приложена листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба

Анджелини Фарма България ЕООД

Бул. Асен Йорданов 10

София 1592, България

Тел.: + 359 2 975 13 95

Факс: + 359 2 971 57 45

Производители

A.C.R.A.F. S.p.A., Via Vecchia del Pinocchio 22, 60131 Ancona, Италия

Famar Nederland B.V., Industrieweg 1, 5531 Ad Bladel, Холандия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

Дата на последно одобрение на листовката ноември 2013