

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 19.12.06г.

Уважаеми пациенти!

За намаляване на болките сте решили да използвате Tantum Verde спрей 0.30% - 15 ml. Моля прочетете листовката и се придържайте към препоръките и указанията.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Тантум Верде спрей 0.30%

Tantum Verde spray 0.30%

Benzydamine hydrochloride 0.30 g

Какво съдържа Tantum Verde спрей 0.30% - 15 ml?

Лекарствено вещество: Benzydamine hydrochloride 0.30 g

Помощни вещества: глицерол; алкохол; захарин; метил р-хидроксибензоат; ментов аромат; полиоксил 40 хидрогенирано рициново масло; дестилирана вода.

Едно впръскване се равнява на около 0.17 ml разтвор

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА: Спрей за устна лигавица 0.30%

ВИД И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА: 15 ml бутилка с дозираща помпа.

Как действа Tantum Verde спрей 0.30% - 15 ml?

Лекарственото вещество Benzydamine притежава силно изразени противовъзпалителни и обезболяващи свойства. То бързо прониква в тъканта и въздейства върху възпалението. Това води до бързо намаляване на болките и оплакванията при гълтане.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА:

“ЦСЦ Фармасютикъл Лтд-България” ЕООД, ул. Асен Йорданов 10, София

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: A.C.R.A.F. S.p.A., Анкона, Италия

ЦСЦ Фармасютикъл –България ЕООД, ул. Асен Йорданов 10, София

Кога се прилага Tantum Verde спрей 0.30% - 15 ml?

Противовъзпалително и обезболяващо средство при възпалителни състояния на гърлото, устната кухина и венците. Tantum Verde може да се прилага и в стоматологичната практика – преди и след вадене на зъб. Tantum Verde спрей 0.30% - 15 ml е показан също след оперативна намеса, при възпаления на ларингса и нарушения при лъчева терапия.

Кога не може да се прилага Tantum Verde спрей 0.30% - 15 ml?

Tantum Verde спрей 0.30% - 15 ml не трябва да се прилага при пациенти с алергия към някоя от съставките на лекарството.

Указания за употреба по време на бременност, кърмене или на краткосрочно лечение

Тъй като няма данни за противопоказания при локална употреба на benzydamine при бременност или кърмене, то Tantum Verde спрей 0.30% - 15 ml трябва да се употребява за краткосрочно лечение и под лекарски контрол.



На какво още трябва да обърнете внимание преди употреба на Tantum Verde спрей 0.30 % - 15 ml?

Ако при краткотрайно лечение с benzodamine не се постигне желания резултат, то незабавно трябва да се консултирате с лекар. Tantum Verde спрей 0.30 % - 15 ml е показан за пациенти, които имат трудности да правят гаргара.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца..

Моля, информирайте незабавно Вашия лекар за всяка появила се нежелана лекарствена реакция. Случайното погълщане на малки количества от лекарственото средство е безвредно.

Моля, информирайте незабавно Вашия лекар, в случаите когато случайно сте погълнали големи количества от Tantum Verde спрей 0.30 % - 15 ml (например от деца). В тези случаи е препоръчително да се предизвика повръщане.


Едновременната употреба на Tantum Verde спрей 0.30 % - 15 ml и други лекарствени продукти

Възможна е употребата на Tantum Verde спрей 0.30% и други лекарствени продукти, тъй като няма данни за нежелани лекарствени реакции.

Как да се използва Tantum Verde спрей 0.30 % - 15 ml?

Приложение във възпалените участъци на гърлото и областта на устата.

Инструкции за употреба:



1. Завъртете дюзата на дозиращата помпа
2. Поставете дюзата в устата и насочете струята към възпалените участъци или гърлото, ако фарингса е възпален.
Натиснете силно бутона на дозиращата помпа

Колко често трябва да се прилага Tantum Verde спрей 0.30 % - 15 ml?

Обикновено от 2 до 6 пъти дневно (през около 1 ½ -3 часа):

2 - 4 впърсквания при възрастни; 2 впърсквания при деца от 6 до 12 години;

1 впърскване на 8 kg телесно тегло при деца под 6 години, до 2 впърсквания.

Какви нежелани лекарствени реакции може да предизвика лечението с Tantum спрей 0.30 % - 15 ml?

Непосредствено след употреба може да се появи изтръпване в устата и гърлото. Този ефект спада към начина на действие на лекарствения продукт и след кратко време отшумява.

В много редки случаи след употреба на Tantum Verde спрей 0.30 % - 15 ml може да се появи леко парене на лигавицата на устната кухина, неразположение или повръщане.



При употреба не по предназначение (напр. при гълтане на големи количества) като нежелани реакции може да се появят смущения в съня, беспокойство, премрежване пред очите, поява на снежинки. Тези реакции отшумяват от само себе си.

Моля, незабавно винформирайте Вашия лекар или фармацевт при появата на нежелани лекарствени реакции, неупоменати в тази листовка за пациента.

В какъв период може да се използва Tantum Verde спрей 0.30 % - 15 ml и как трябва да се съхранява той?

Да се съхранява при температура под +25⁰ C .

Не използвайте спрея след указаната на опаковката дата на годност.

ПОСЛЕДНА РЕАКЦИЯ НА ТЕКСТА: Август 2004

