

Репарил 20 mg стомашно-устойчиви таблетки

Есцин

Прочетете цялата информация внимателно, защото е важна за вас.

Този лекарствен продукт се предлага без лекарско предписание. Независимо от това *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки трябва да се вземат внимателно за постигане на оптимални резултати.

- Пазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашият фармацевт.
- Трябва да отидете на лекар, ако симптомите ви се влошават или не настъпва подобрение
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или ако забележите някои неспоменати в тази листовка нежелани реакции, моля информирайте вашия лекар или фармацевт.

Съдържание на листовката:

1. Какво представляват *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки и за какво се използват
2. Преди да се използват *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки
3. Как да се използват *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Начин на съхранение на *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки
6. Допълнителна информация

1. Какво представляват *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки и за какво се използват
Репарил стомашно-устойчиви таблетки притежават отбъбващо (противооточно) действие.
Репарил стомашно-устойчиви таблетки се използват при локализирани отоци след травми.

2. Преди да вземете *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки

Не вземайте *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки:

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към есцин или някоя от другите съставки,
- Ако страдате от бъбречна недостатъчност или заболявания на бъбреците
- Ако сте бременна или кърмачка

Специални предупреждения при употреба на *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки няма.

Деца

Репарил стомашно-устойчиви таблетки не трябва да се употребяват от деца под 7 години.

Едновременна употреба с други лекарства:

Действието на антикоагулантите може да се засили от есцина.



Едновременната употреба с антибиотици от аминогликозиден тип (напр. гентамицин) трябва да се избягва, защото не може напълно да се изключи възможността тяхната токсичност върху бъбреците да се засили.

Свързването на есцина с плазмените протеини може да бъде спряно от антибиотиките. Цефалотин и ампицилин, например, предизвикват повишаване на концентрацията на свободния серумен есцин.

Поради това сломенатите субстанции не трябва да се предписват едновременно с *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт ако вземате или сте вземали наскоро някакви други лекарства, даже и такива, които са без рецепта.

Бременност и кърмене

Репарил стомашно-устойчиви таблетки не трябва да се употребява по време на бременност, тъй като изследванията при животни са недостатъчни що се отнася до ефектите върху бременността или ембрионалното и фетално развитие. Наблюдения за прилагане при бременни жени не са документирани.

Тъй като не се знае до каква степен лекарственото вещество преминава в кърмата, по време на лечение кърменето е противопоказано.

Съветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на каквото и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Не се изискват специални предупреждения.

Важна информация за някои от съставките на *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки

Лекарственият продукт съдържа лактоза и захароза (захар). Поради това ако страдате от непоносимост към захар, приемайте *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки само след консултация с Вашия лекар.

3. Как да се употребяват *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки

Винаги приемайте *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки според указанията в тази листовка. Ако сте несигурни, консултирайте се с лекар или фармацевт.

Ако не е предписано друго от Вашия лекар, обичайната дозировка е:

Възрастни и юноши над 14 години трябва да приемат като начална доза 2 таблетки 3 пъти дневно.

В по-леки случаи или като поддържаща доза трябва да се приема 1 таблетка 3 пъти дневно.

Деца между 7 и 14 години трябва да приемат 1 таблетка 2 до 3 пъти дневно.

Начин на приложение:

Приемайте *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки без да ги дъвчете, след храна с малко течност.

Продължителност на приложение:

Няма ограничения по отношение на продължителността на приложение.

Ако сте приели повече *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки, отколкото трябва:

Не са известни симптоми на предозиране или отравяне.

Ако имате допълнителни въпроси за употребата на този продукт, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции



Както всички лекарства, *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки може да има нежелани реакции, макар че не се проявяват при всеки.

Използват се следните данни за определяне честотата на тези реакции:

Много чести	повече от 1 на 10 от третираните пациенти
Чести	1 до 10 от 100 третиранни пациенти
Нечести	1 до 10 от 1,000 третиранни пациенти
Редки	1 до 10 от 10,000 третиранни пациенти
Много редки	По-малко от 1 от 10,000 третиранни пациенти
Неизвестна	Честотата не може да бъде преценена от наличните данни

Много рядко могат да настъпят реакции на свръхчувствителност като напр. уртикария.

С неизвестна честота: стомашно-чревни смущения.

Специални забележки:

В случай на свръхчувствителност, употребата на *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки трябва да спре.

Ако забележите някои неспоменати в тази листовка нежелани реакции, моля информирайте вашия лекар или фармацевт.

5. Начин на съхранение на *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки

Да се пазят на място, недостъпно за деца.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отпечатан на блистера и кутиятката.

Условия на съхранение:

Не се изискват специални условия на съхранение.

6. Допълнителна информация

Какво съдържат *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки:

Лекарственото вещество е:

1 стомашно-устойчива таблетка съдържа Escin (есцин) 20 mg

Помощни вещества: лактоза монохидрат; повидон (К 29-32); магнезиев стеарат; захароза; талк; арабска гума; титанов диоксид E171; силициев диоксид, колоиден безводен; полиетил акрилат, метакрилат; макрогол 8000; натриев хидроксид; кармелоза натрий; триетилов цитрат; симетикон емулсия; пчелен восък, бял; карнаубски восък.

Как изглежда *Репарил* стомашно-устойчиви таблетки и съдържание на опаковката:

Опаковки: картонени кутии с по 20, 40, 50 или 100 бели гладки стомашно-устойчиви таблетки.

Фармацевтичен предприемач:

Rottapharm/Madaus GmbH, D-51101 Köln

Tel. 0049 221 8998-0, fax: 0049 221 8998 -711

Производител и притежател на разрешението за употреба:

Madaus GmbH

51101 Cologne

Германия

Последна редакция на информацията – Март 2012 г.

Reg. № 20070063

