

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Гавискон Ягода Таблетки 250 mg / 133,5 mg / 80 mg таблетки за дъвчене  
Натриев алгинат/Натриев хидроген карбонат/Калциев карбонат

Gaviscon Strawberry Tablets 250 mg / 133,5 mg / 80 mg chewable tablets  
Sodium alginate/Sodium hydrogen carbonate/Calcium carbonate

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА
Листовка - Приложение 2
КЪМ ТЪВ. № 20150085
Разрешение № 11-28831/24-03-2015
Одобрение № .....

Прочетете внимателно листовката, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.  
Ако имате някакви съмнения, попитайте Вашия лекар или фармацевт

### 1. Какво представлява Гавискон Ягода Таблетки и за какво се използва?

Гавискон Ягода Таблетки спада към група лекарства, наречени „супресори на рефлукса“, които образуват защитен слой по повърхността на стомашното съдържимо, за да възпрепятства изтичането на стомашна киселина от стомаха към хранопровода, където причинява болка и дискомфорт.

Това лекарство се използва за лечение на симптоми на гастро-езофагеален рефлукс, като киселинна регургитация, киселини от стомаха и нарушено храносмилане, свързани с рефлукса, например след хранене или по време на бременност, или при пациенти със симптоми свързани с рефлукс езофагит.

### 2. Преди да използвате Гавискон Ягода Таблетки

Не приемайте този продукт:

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към някоя от съставките на Гавискон Ягода Таблетки, тъй като много рядко е възможно да се появят затруднено дишане и кожни обриви (виж информацията по-долу за пълния списък на нежелани реакции).

Обърнете специално внимание при употреба на Гавискон Ягода Таблетки:

Този лекарствен продукт съдържа натрий (10,6 mmol за доза от 4 таблетки) и калций (3,2 mmol за доза от 4 таблетки).

- Ако сте посъветвани да спазвате строга ограничителна диета по отношение на тези соли, моля консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете този продукт.
- Ако страдате от сериозно бъбречно или сърдечно заболяване, посъветвайте се с Вашия лекар относно количеството на тези соли, тъй като такива соли могат да повлияят на тези заболявания.

Ако страдате от фенилкетонурия трябва да имате предвид, че този лекарствен продукт е подсладен с аспартам, източник на фенилаланин.

Посъветвайте се с Вашия лекар ако Ви е известно, че имате понижени нива на солна киселина в стомаха, тъй като ефективността на този лекарствен продукт в тези случаи може да е намалена.

**Прием на други лекарства:**

Не приемайте този лекарствен продукт в рамките на 2 часа от приема на други лекарствени продукти през устата, тъй като може да повлияе действието на другите лекарствени продукти.

**Бременност и кърмене:**

Този лекарствен продукт може да се прилага по време на бременност и кърмене. Както за всички лекарства, продължителността на лечение трябва да е възможно най-кратка.

### 3. Как да приемате Гавискон Ягода Таблетки:

За перорална употреба. Сдъвчете добре таблетката преди да преглътнете.

Възрастни, включително в старческа възраст и деца над 12-годишна възраст: При появата на симптоми вземете 2 до 4 таблетки след хранене и преди сън.

Деца под 12-годишна възраст: Прилага се само по лекарска препоръка.



Ако пропуснете приема на една доза, не приемайте двойна доза следващия път, а продължете обичайния прием на лекарствения продукт.

Ако сте приели по-голямо количество от лекарствения продукт може да почувствате подуване на корема. Малко е вероятно това да Ви навреди, въпреки това, моля консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

**След прием на Гавискон Ягода Таблетки:**

Ако симптомите не се подобрят до седем дни, консултирайте се с Вашия лекар.

**4. Възможни нежелани реакции:**

Много рядко (по-малко от 1 на 10 000) може да се наблюдават алергични реакции към помощните вещества. Симптомите могат да включват кожни обриви, сърбеж, затруднено дишане, замаяност или отоци на лицето, устните, езика или гърлото. Ако някоя от тези нежелани реакции стане сериозна или ако забележите реакции неописани в тази листовка спрете приема и веднага се консултирайте с Вашия лекар.

**5. Съхраняване на Гавискон Ягода Таблетки:**

Не използвайте Гавискон Ягода Таблетки след изтичане срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C.

**6. Допълнителна информация**

Гавискон Ягода Таблетки представляват светло розови, кръгли със скосени краища таблетки с мирис и вкус на ягода. Таблетките са с маркировка - сабя и кръг от едната страна и GS250 от другата страна. Всяка таблетка за дъвчене съдържа 250 mg натриев алгинат, 133,5 mg натриев хидрогенкарбонат и 80 mg калциев карбонат.

Другите съставки са: манитол (E421), макрогол 20 000, аспартам (E951), аромат на ягода (малтодекстрин, модифицирано нишесте (E1450), растително масло, пропилен гликол (E1520)), червен железен оксид (E172), ксилитол, кармелоза натрий, магнезиев стеарат.

Таблетките не съдържат захар и глутен.

Гавискон Ягода Таблетки се предлагат в следните опаковки: блистерни опаковки от 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 и 64 таблетки за дъвчене поставени в картонена кутия.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

**Притежател на разрешението за употреба**

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.  
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3HU  
Обединено кралство

**Производител**

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited  
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Обединено кралство

Дата на последното одобряване на листовката: август 2014



**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ****ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА****Гавискон Ягода Таблетки 250 mg / 133,5 mg / 80 mg**

Натриев алгинат / Натриев хидроген карбонат / Калциев карбонат

Таблетки за дъвчене

К.СМ.Р.Е. №

**Gaviscon Strawberry Tablets 250 mg / 133,5 mg / 80 mg**

Sodium alginate/Sodium hydrogen carbonate/Calcium carbonate

chewable tablets

Разрешение №

Одобрение №

2015089

2883/24-03-2015

Тези таблетки водят до облекчаване на болката и дискомфорта, както и от киселините в стомаха и нарушено храносмилане, които се появяват след хранене или по време на бременност. Този лекарствен продукт спада към група лекарства, наречени „супресори на рефлукса“, които образуват защитен слой по повърхността на стомашното съдържимо, за да възпрепятства изтичането на стомашна киселина от стомаха към хранопровода, където причинява болка и дискомфорт.

**ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ:** Не приемайте Гавискон Ягода Таблетки ако сте алергични към някоя от съставките (виж информацията по-долу за пълния списък на нежелани реакции).

Всяка доза от 4 таблетки съдържа натрий 10,6 mmol и калций 3,2 mmol. Ако сте посъветвани да спазвате строга ограничителна диета по отношение на тези вещества, моля консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете този лекарствен продукт. Ако страдате от сериозно бъбречно или сърдечно заболяване, посъветвайте се с Вашия лекар относно количеството на тези соли, тъй като такива соли могат да повлияят на тези заболявания.

Ако страдате от фенилкетонурия трябва да имате предвид, че този лекарствен продукт е подсладен с аспартам, източник на фенилаланин.

Посъветвайте се с Вашия лекар ако Ви е известно, че имате понижени нива на солна киселина в стомаха, тъй като ефективността на този лекарствен продукт в тези случаи може да е намалена.

Този лекарствен продукт може да се прилага по време на бременност и кърмене.

Независимо от това, продължителността на лечение трябва да е възможно най-кратка.

**ДОЗИРОВКА:** За перорална употреба. Сдъвчете добре таблетката преди да преглътнете.

**Възрастни, включително в старческа възраст, и деца над 12-годишна възраст:** При появата на симптоми вземете 2 до 4 таблетки след хранене и преди сън.

**Деца под 12-годишна възраст:** Прилага се само по лекарска препоръка.

Ако пропуснете приема на една доза, не приемайте двойна доза следващия път, а продължете обичайния прием на лекарствения продукт.

Ако сте приели по-голямо количество от лекарствения продукт, може да почувствате подуване на корема. Малко е вероятно това да Ви навреди, въпреки това, моля консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Не приемайте този лекарствен продукт в рамките на 2 часа от приема на други лекарствени продукти през устата, тъй като може да повлияе действието на другите лекарствени продукти.

**СЛЕД ПРИЕМ НА ТОЗИ ПРОДУКТ:** Ако симптомите не се подобрят до седем дни, консултирайте се с Вашия лекар.

**ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ:** Много рядко (по-малко от 1 на 10 000) може да се наблюдават алергични реакции към съставките. Симптомите могат да включват кожни обриви, сърбеж, затруднено дишане, замаяност или отоци на лицето, устните, езика или гърлото. Ако получите някоя от тези нежелани реакции или ако забележите други реакции неописани в тази листовка спрете приема и веднага се консултирайте с Вашия лекар.

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:** Гавискон Ягода Таблетки представляват светло розови, кръгли със скосени краища таблетки с мирис и вкус на ягода. Таблетките са с маркировка - сабя и кръг от едната страна и GS250 от другата страна. Всяка таблетка за дъвчене съдържа 250 mg натриев алгинат, 133,5 mg натриев хидрогенкарбонат и 80 mg калциев карбонат.



Другите съставки са: манитол (E421), макрогол 20 000, аспартам (E951), аромат на ягода, (малтодекстрин, модифицирано нишесте (E1450), растително масло, пропилен гликол (E1520)), червен железен оксид (E172), ксилитол, кармелоза натрий, магнезиев стеарат.

Таблетките не съдържат захар и глутен.

Съхранявайте при температура под 25° C.

Пропиленова опаковка: Да се използва до 6 месеца след отваряне.

Да не се използва след изтичане на посочения срок на годност.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Гавискон Ягода Таблетки се предлагат в полипропиленова опаковка: 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 или 2 x 24 таблетки за дъвчене.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

**Притежател на разрешението за употреба**

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3HU

Обединено кралство

**Производител**

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Обединено кралство

Дата на последното одобряване на листовката: август 2014

