

ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ДЕТРАЛЕКС 500mg фирмирани таблетки

DETRALEX® 500mg film-coated tablets

N=5125.05.2009

Одобрено:

Флавоноидна фракция, пречистена и микронизирана
 (количество, съответстващо на флавоноиди, изразени като Хесперидин: 10%; Диосмин: 90%).

Прочетете внимателно цялата листовка, защото тя съдържа важна за Вас информация.

Този лекарствен продукт се отпуска без лекарско предписание. Независимо от това е необходимо да при приемате ДЕТРАЛЕКС внимателно, за да получите възможно най-добри резултати от лечението с него.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси или имате нужда от съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Свържете се с Вашия лекар, ако симптомите Ви се влошат или не се подобрят.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява ДЕТРАЛЕКС и за какво се използва
2. Преди да приемете ДЕТРАЛЕКС
3. Как да приемате ДЕТРАЛЕКС
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ДЕТРАЛЕКС
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДЕТРАЛЕКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ДЕТРАЛЕКС е венотоник (повишава венозния тонус) и вазопротектор (повишава устойчивостта на малките кръвоносни съдове).

ДЕТРАЛЕКС се препоръчва за симптоматично лечение на венозно-съдови нарушения (отекли крака, болка, изморени крака) и за симптоматично лечение при остри хемороидални кризи.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ДЕТРАЛЕКС

Не приемайте ДЕТРАЛЕКС

Ако сте алергичен (свръхчувствителен) към микронизирана пречистена флавоноидна фракция или към някое от помощните вещества на ДЕТРАЛЕКС.

Обърнете специално внимание при употребата на ДЕТРАЛЕКС

- **Хемороиди:**

Ако хемороидите не изчезнат до 15 дни, би трябвало да потърсите Вашия лекар за съвет.

- **Венозно-съдови нарушения:**

Лечението води до максимално добър резултат, ако се съчетава със здравословен начин на живот. Избягвайте излагане на сълнце, топлина, продължително стоеене на крака, наднормено тегло. Ходенето и носенето на специални (компресиращи) чорапи подобрява циркуляцията.

Прием на други лекарства

Моля кажете на Вашия лекар или фармацевт ако вземате или насокоро сте вземали някакви други лекарства, включително и такива, получени без рецепт.

Прием на ДЕТРАЛЕКС с храни и напитки

Препоръчва се ДЕТРАЛЕКС да се приема по време на храна (вж. т. 3 КАК ДА ПРИЕМАТЕ ДЕТРАЛЕКС)

Бременност и кърмене

Поради отсъствието на данни относно излъчването в майчиното мляко, лечението с ДЕТРАЛЕКС по време на кърменето трябва да се избягва.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употреба на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

ДЕТРАЛЕКС не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на ДЕТРАЛЕКС

Неприложимо

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ДЕТРАЛЕКС

Перорално приложение.


Винаги вземайте ДЕТРАЛЕКС точно както Вашия лекар или фармацевт Ви е казал. Говорете с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурен за нещо. Обичайната дозировка е:

- **Венозна недостатъчност:**

2 таблетки дневно, 1 таблетка на обяд и 1 таблетка вечер, по време на хранене.

- **Хемороиди:**

4-дневен курс от 6 таблетки дневно, последвани от по 4 таблетки дневно през следващите 3 дни, по време на хранене.



Ако сте приели повече от необходимата доза ДЕТРАЛЕКС

Неприложимо.

Ако сте пропуснали да приемете ДЕТРАЛЕКС

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате забравената доза.

Ако сте спрели приема на ДЕТРАЛЕКС

Неприложимо.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, ДЕТРАЛЕКС може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Описани са редки случаи на леки стомашни смущения, невровегетативни смущения (усещане за дискомфорт) и кожни реакции (обрив, силен сърбеж, уртикария), които не налагат прекъсване на лечението.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или ако забележите нежелани реакции, които не са описани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ДЕТРАЛЕКС

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте ДЕТРАЛЕКС след срока на годност, отбелязан на картонената опаковка след Годен до. Срока на годност се отнася до последния ден на дадения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ДЕТРАЛЕКС

- Активното вещество е flavonoidна фракция, пречистена и микронизирана. Една таблетка съдържа 500mg flavonoidна фракция, пречистена и микронизирана, количество, съответстващо на: flavonoidи, изразени като хесперидин: 10% - 50 mg; диосмин: 90% - 450 mg .

- Другите съставки са: натриев гликолат, микрокристална целулоза, желатин, магнезиев стеарат, талк, глицерол, хипромелоза, макрогол 6000, натриев лаурилсулфат, жълт железен оксид (Е 172), червен железен оксид (Е 172), титанов диоксид (Е 171).

Как изглежда ДЕТРАЛЕКС и какво съдържа опаковката

ДЕТРАЛЕКС са розовооранжеви, овални филмирани таблетки. Една таблетка съдържа 500 mg флавоноидна фракция, пречистена и микронизирана. Таблетките са налични в кутии от 30 или 60 филмирани таблетки в PVC/Алуминиеви блистери.

Не всички видове опаковки могат да бъдат налични.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Les Laboratoires Servier
22 rue Garnier
92200 Neuilly sur Seine
Франция

Производител

Les Laboratoires Servier Industrie
905 route de Saran
45520 Gidy
Франция

Местен представител на притежателя на разрешението за употреба:

СЕРВИЕ МЕДИКАЛ ЕООД
Тел: 921 57 00
София

ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

03/2009

