

ОДОБРЕНО!
ДАТА ...31.07.2008...

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТРИБЕСТАН® 250 mg филмирани таблетки

TRIBESTAN® 250 mg film-coated tablets

сух екстракт от растението Бабини зъби (*Tribulus terrestris herba extractum siccum*)

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Трибестан и за какво се използва
2. Преди да използвате Трибестан
3. Как да приемате Трибестан
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Трибестан
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТРИБЕСТАН

Трибестан е растителен продукт, който съдържа сух екстракт от надземната част на растението *Tribulus terrestris* (Бабини зъби). Трибестан стимулира функциите на половата система, повишава либидото, увеличава силата и продължителността на ерекцията, повлиява благоприятно липидната обмяна, притежава хормон-балансиращ ефект и при жени облекчава климактеричните симптоми.

Трибестан се използва в комплексното лечение на понижено либидо, импотенция (полова слабост), бесплодие при мъже; при дислипопротеинемия (нарушения в обмяната на липидите) за намаляване на общия холестерол и липопротеините с ниска плътност; при жени с климактеричен и посткастракционен синдром (състояние след оперативно отстраняване на яйчниците) за облекчаване на изявени неврогенетативни и невропсихични прояви.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТРИБЕСТАН

Не приемайте Трибестан

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от останалите съставки;
- при тежко сърдечно-съдово или бъбречно заболяване;
- при адено на простатата;
- ако сте на възраст под 16 години;
- Трибестан не се употребява по време на бременност или в периода на кърмене.

Обърнете специално внимание при употребата на Трибестан

- При лечение на жени в климактериум преминаването от лечебна към поддържаща доза трябва да става постепенно. След рязко намаляване или спиране на ефективната доза е възможна вторична проява на комплекса от климактерични симптоми.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или накоре сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.
Едновременното приложение на Трибестан с лекарствени продукти, стимулиращи овулацията, води до взаимно усилване на ефектите им.

Трибестан може да усили ефектите на диуретици (отводняващи лекарства) и на антихипертензивните лекарства (за лечение на високо кръвно налягане).

Бременност и кърмене

Преди да вземете никакво лекарство по време на бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Трибестан не трябва да се прилага през периода на бременност и кърмене. При установяване на бременност приемът на продукта трябва да се прекрати.

Шофиране и работа с машини

Трибестан не повлиява активното внимание и може да се използва от шофьори и оператори на машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ТРИБЕСТАН

Приемайте Трибестан както е описано в тази листовка. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Таблетките се приемат през устата, след хранене.

При понижено либидо, импотенция и безплодие:

При мъже с понижено либидо, импотенция и безплодие се препоръчва дозировка по 1-2 таблетки 3 пъти дневно. Продължителност на лечението - най-малко 90 дни. Курсът на лечение може да се повтаря до получаване на задоволителен лечебен ефект.

При жени с ендокринен стерилитет се препоръчва дозировка по 1-2 таблетки 3 пъти дневно, прилагани от 1-ви до 12-ти ден на менструалния цикъл. Този курс може да се повтаря периодично до забременяване.

Дислипопротеинемия:

По 2 таблетки 3 пъти дневно. Продължителност на лечението - не по-малко от 3 месеца.

Климактеричен и посткастриционен синдром у жените:

По 1-2 таблетки 3 пъти дневно в продължение на 60-90 дни. След подобряване на състоянието постепенно се преминава към поддържаща доза – по 2 таблетки дневно в продължение на 1-2 години.

Ако сте приели повече от необходимата доза Трибестан

Досега не са наблюдавани случаи на предозиране с Трибестан. В случай на приемане на по-голямо количество от продукта се обрънете към лекар. При необходимост се прави стомашна промивка и се прилага симптоматично лечение.

Ако сте пропуснали да приемете Трибестан

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства Трибестан може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При предразположени пациенти е възможно е да се наблюдават реакции на свръхчувствителност. Може да има дразнещо действие върху стомашната лигавица.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

СЪХРАНЕНИЕ НА ТРИБЕСТАН

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Лекарството не трябва да се използва след датата на изтичане на годност, отбелязан върху опаковката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Трибестан

- Активната съставка е сух екстракт от растението Бабини зъби (*Tribulus terrestris herba extractum siccum* (35-45:1)) 250 mg (съдържание на фуростанолови сапонини не по-малко от 112,5 mg).
- Другите съставки са: микрокристална целулоза; силициев диоксид, колоиден безводен; повидон K25; кросповидон; магнезиев стеарат; талк.
- Състав на филмовото покритие: опадрай кафяв.

Как изглежда Трибестан и какво съдържа опаковката

Филмирани таблетки - кръгли, двойноизпъкнали с кафяв цвят. По 10 филмирани таблетки в блистер от PVC/алуминиево фолио; по 6 блистера в картонена кутия, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

СОФАРМА АД

ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

Дата на последно одобрение на листовката: юли 2008