


## ЛИСТОВКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**МАГНЕ В6 48 mg / 5 mg обвити таблетки**  
**MAGNE В6 48 mg / 5 mg coated tablets**  
**Магнезиев лактат дихидрат (Magnesium lactate dihydrate)**  
**Пиридоксинов хидрохлорид (Pyridoxine hydrochloride)**



**Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.** Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

### **В тази листовка:**

1. Какво представлява **Магне В6** и за какво се използва
2. Преди да приемете **Магне В6**
3. Как да приемате **Магне В6**
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате **Магне В6**
6. Допълнителна информация

## **1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МАГНЕ В6 И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

**МАГНЕ В6** принадлежи към групата на минерални добавки.

Това лекарство съдържа магнезий.

Установен магнезиев дефицит- изолиран или комбиниран, който може да бъде изразен с някои от следните симптоми:

- нервност, раздразнителност, умерена тревожност, преходна отпадналост, леки разстройства на съня,
- признаци на напрегнатост, като стомашно-чревни спазми или сърцебиене (при здраво сърце),
- мускулни крампи, изтръпване.


Прилагането на магнезий може да помогне за лечението на подобни симптоми.

## **2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕТЕ МАГНЕ В6**

**Не приемайте Магне В6 при:**

- известна алергия (свърхчувствителност) към активните вещества или към някои от останалите съставки,
- остра бъбречна недостатъчност.

**Обърнете специално внимание при употребата на Магне В6**



### Предупреждения

Поради наличието на захароза, това лекарство е противопоказано за диабетно болни.

### Предпазни мерки при употреба

**ТОВА ЛЕКАРСТВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГА САМО ПРИ ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 6 ГОДИНИ.**

За деца на възраст под 6 години се предлагат подходящи лекарствени форми.

В случаи на умерена бъбречна недостатъчност, трябва да се вземат предпазни мерки за предотвратяване риска от хипермагнезиемия.

Лечението се прекратява веднага след нормализиране нивото на магнезия.

Ако след едномесечно лечение не се наблюдава подобрене на симптоматиката, обърнете се към Вашия лекар за съвет.

*Ако не сте сигурни обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.*

### **Важна информация преди употребата на Магне В6**

Преди употреба трябва да информирате лекуващия Ви лекар, ако имате или сте имали следните случаи на:

- съпътстващ калциев дефицит
- проблеми с бъбреците
- страдате от диабет (в таблетките се съдържа захароза)

**Таблетките са предназначени за възрастни и деца над 6 години.**

### **Прием на други лекарства**

Трябва да информирате Вашия лекар за всяко вземано от Вас лекарство включително и такива без лекарско предписание и такива, съдържащи фосфатни или калциеви соли.

### **Бременност и кърмене**

Това лекарство може да се употребява по време на бременност само, ако бъде предписано от лекар.

Ако се окаже, че вие сте бременна по време на лечението, то консултирайте се с Вашия лекар и той може да реши дали да прекъснете лечението.

Използването на това лекарство по време на кърмене трябва да се избягва.

*Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.*

### **Шофиране и работа с машини**

Няма специални препоръки относно шофирането и работата с машини.

### **Важна информация относно някои от съставките на Магне В6**

Трябва да се вземе предвид съдържанието на захароза в състава на лекарството.


## **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ МАГНЕ В6**

Винаги приемайте Магне В6 точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт

### **Дозировка и начин на употреба.**

**ТОВА ЛЕКАРСТВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГА САМО ПРИ ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 6 ГОДИНИ.**

**Възрастни:** от 6 до 8 таблетки дневно, разделени на 2 или 3 приема по време на хранене.



**Производител**

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE  
1,rue de la Vierge-33440 Ambares-Франция

или  
Chinoin Pharmaceutical and  
Chemical Works Private Co. Ltd,  
Habor Park Campona u.1 1222 Budapest -Унгария

**Дата на последната редакция:**  
Август 2008

