


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Уважаеми пациенти, моля прочетете внимателно тази листовка, защото тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар.

Tonsilotren - Тонзилотрен



Състав:

1 таблетка съдържа:	
Atropinum sulfuricum trit. D5	12,5 mg
Hepar sulfuris trit. D3	10,0 mg
Kalium bichromicum trit. D4	50,0 mg
Mercurius bijodatus trit. D8	25,0 mg
Silicea trit. D2	5,0 mg

Помощни вещества:

Лактоза монохидрат, захароза, магнезиев стеарат

Какво представлява Тонзилотрен?

Тонзилотрен е хомеопатичен лекарствен продукт.

60 таблетки за смучене в опаковка, на блистери по 20 броя таблетки.

Тонзилотрен е комбинация от пет добре доказани отделни хомеопатични средства, която е особено подходяща за лечение на възпаления на лимфните жлези, обграждащи гърлото – като остри фарингити, остри катарални или тонзиларни ангини, а също така и при оперативно отстраняване на сливиците (тонзилектомия). *Atropinum sulfuricum* има положителен ефект при началните температурни фази, които включват зачервено гърло, подути сливици и характерни подтици за преглъщане. Останалите четири компонента на Тонзилотрен се допълват взаимно в лечението на подострите до хронични случаи, често придружени с формиране на мукус (слуз). *Mercurius bijodatus*, е особено подходящ за успокояване на сливиците, както и на лимфните жлези при фарингит. *Hepar sulfuris* има положително действие върху упоритите и повтарящи се възпаления, както и върху острите болки, които се разпростират към ушите. *Kalium bichromicum* спомага за преодоляване на трудностите с преглъщането, успокоява уголемените сливици и съдейства за премахване на полипите. *Silicea* ускорява оздравителния процес при възпаленията и намалява податливостта към инфекции, чрез стимулиране на имунната система. Като цяло, Тонзилотрен, благодарение на синергетичния си ефект, осигурен от петте активни съставки, осигурява ефективност през всички фази на възпалението от началните оплаквания до излекуване на рецидивите. Тонзилотрен е доказал клиничната си ефективност в лечението на увеличени сливици.

За какво се използва Тонзилотрен?

За лечение на остри и хронични рецидивиращи тонзилити, увеличаване на сливиците в детска възраст и лечение след хирургично отстраняване на сливиците.



Кога не трябва да приемате Тонзилотрен?

Да не се прилага при хора с известна свръхчувствителност към хром или друга от съставките на продукта.

Да не се използва от пациенти, страдащи от хиперфункция на щитовидната жлеза, без предварителна консултация с лекар.

Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при приемането на Тонзилотрен?

Ако оплакванията Ви продължават или състоянието Ви се влоши, посъветвайте се с лекуващия Ви лекар.

Специални предупреждения:

1 таблетка Тонзилотрен съдържа 122,50 mg лактоза монохидрат. Неподходящ при хора с лактазна недостатъчност, галактоземия или глюкозен / галактозен синдром на малабсорбция.

Какво трябва да имате предвид ако сте бременна или кърмите?

Както при всички останали лекарства, по време на бременност или кърмене, Тонзилотрен трябва да се приема само след консултация с лекар.

Кои други лекарства могат да повлияят ефекта на Тонзилотрен или могат да бъдат повлияни?

Няма данни за взаимодействия с други лекарства или с храна.

Как можете да използвате Тонзилотрен?

Следвайте посочената дозировка или както е изписано от Вашия лекар:

Възрастни: При остри състояния се приемат по 1-2 таблетки на интервали от един час до максимум 12 таблетки дневно, докато не настъпи подобрене. За последващо лечение или при хронични тонзилити се приемат по 1-2 таблетки 3 пъти дневно.

Деца до 12 години: При остри състояния се приема по 1 таблетка на всеки два часа до максимум 8 таблетки дневно, докато не настъпи подобрене. За последващо лечение или при хронични тонзилити се приема по 1 таблетка 3 пъти дневно.

Да не се прилага при деца под една година, поради липса на достатъчно опит с употребата на продукта в тази възраст. При деца от 1 до 3 години може да се прилага само след консултация с лекар.

При увеличени сливици курсът на лечение трябва да продължи поне 6-8 седмици. При често проявяваща се ангина е полезно веднъж годишно провеждане на лечението.

Приемайте таблетките половин час преди или след хранене и ги оставете да се разтопят в устата. За малки деца е препоръчително таблетките да се разтварят в малко вода.

Какви нежелани лекарствени реакции могат да бъдат причинени от Тонзилотрен?

В отделни случаи може да се получи увеличаване на слюноотделянето след приемане на Тонзилотрен. Ако това се случи, намалете дозата или преустановете лечението.



В редки случаи може да възникнат реакции на свръхчувствителност, като кожни реакции. При тези обстоятелства прекъснете приема на Тонзилотрен .

Съществуващите оплаквания могат временно да се влошат, когато се приемат хомеопатични лекарства (начално влошаване). В такива случаи е необходимо да се консултирате с лекар и да преустановите лечението.

Инструкции за съхранение на Тонзилотрен

Да се съхранява при стайна температура.

Да се съхранява на място недостъпно за деца!

Срок на годност:

5 години

Производител и притежател на разрешителното за употреба

Deutsche Homöopathie-Union,
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24
76227 Karlsruhe
Germany

Медицинско представителство за България

АД Либра

Дата на последна поправка на текста

Юни 2004

