

ATUSIN® BABY

SYRUP

100 ml €

! Прочетете внимателно тази листовка преди да започнете приема на препарата.

! Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекар.

Съдържание на листовката

- I. Какво трябва да знаем за кашлицата?
- II. Какво е ATUSIN® BABY?
- III. Как се приема ATUSIN® BABY?
- IV. Странични ефекти и противопоказания
- V. Съхранение

I. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА КАШЛИЦАТА?

Кашлицата е естествен защитен рефлекторен механизъм, чрез който организмът се стреми да изхвърли от дихателните си пътища секрети или попаднало там чуждо тяло. Дихателните пътища - гърло, фаринкс, трахея, бронхи, бял дроб, са входна врата за много болестотворни микроорганизми. Поради това, често именно дихателните пътища са най-засегнати от инфекциозни причинители. Кашлицата се проявява при дразнене на специфични рецептори в дихателните пътища. Раздразнените рецептори изпращат нервни импулси до мозъка, който реагира, като подава сигнал за кашляне, тъй като се опитва да изхвърли дразнещия компонент извън организма.

Когато организмът е здрав, кашлицата успява да изчисти успешно дихателните пътища. При възпаление на дихателните пътища, причинено от грип, настинка и други вирусни или бактериални респираторни инфекции, кашличният рефлекс не е достатъчен, за да изхвърли насъбраните секрети. Поради това, често е необходимо да се използват средства, подпомагащи изкашлянето на секретите, омекотяващи и успокояващи дразненето. Кашлицата може да бъде влажна или суха:

- При *влажната кашлица* се образува секрет, който улавя болестотворните микроорганизми, попаднали в дихателните пътища. Чрез движенията на ресничките на епитела на дихателните пътища този секрет се придвижва нагоре, и чрез кашляне се извежда извън дихателните пътища. За да се спре инфекцията и кашлицата, организмът трябва да се освободи от натрупания секрет.
- *Сухата кашлица* не е свързана с увеличено образуване на секрет и най-често е съпътствана с дразнене на рецепторите в гърлото и фаринкса, предизвиквайки мъчително кашляне. При задълбочаване на инфекцията, сухата кашлица може да премине във влажна. Сухата кашлица може да бъде и доста болезнена, тъй като постоянните непродуктивни позиви за кашляне, дразнят и „драскат“ гърлото, напрягат мускулите на гръдния кош и пренапрягат дихателните пътища.

II. КАКВО Е ATUSIN® BABY?

ATUSIN® BABY (АТУСИН® БЕБЕ) е сироп, който оказва благоприятен ефект върху здравето на дихателните пътища – бял дроб, бронхи, трахея, фаринкс, гърло. Поддържа чувството за комфорт в гърлото и гърдите. Подкрепя дишането. Има приятен вкус. Подходящ е за деца.

Състав на препоръчаната дневна доза за деца от 3 до 12 м. (15 ml):

- 2,25 ml – Глицерол

Състав на препоръчаната дневна доза за деца от 1 до 5 г. (30 ml):

- 4,5 ml – Глицерол

Помощни вещества: вода, подсладител – ксилитол, консервант – калиев сорбат, регулатор на киселинността – лимонена киселина.

ATUSIN® BABY е хранителна добавка.

Не съдържа аспартам.

Не съдържа добавена захар.

Не съдържа оцветители.

Глицеролът е фармакопееен продукт с изразено омекотяващо действие¹.

Представява безцветна течност със сладък вкус. Безвреден е за организма. Използва се в медицината и фармацевтиката за приготвяне на сиропи за кашлица, еликсир и други отхрачващи средства, заради омекотяващите и овлажняващите му свойства. След перорален прием покрива, овлажнява и защитава дихателната мукоза, като по този начин намалява гразненето. Действа благоприятно на лигавицата на дихателните пътища, поддържа и подпомага чувството за комфорт в гърлото и фаринкса. Глицеролът е подходящ и препоръчан от Световната Здравна Организация (СЗО) за употреба при малки деца².

1. Britain. PS of G. The British Pharmaceutical Codex, 1911 : An Imperial Dispensatory for the Use of Medical Practitioners and Pharmacists. London: Pharmaceutical Society of Great Britain; 1911.

2. WHO. Cough and cold remedies for the treatment of acute respiratory infections in young children. WHO/FCH/CAH/0102. 2001.
<http://www.who.int/iris/handle/10665/66856>.

III. КАК СЕ ПРИЕМА ATUSIN® BABY?

В случай, че Вашият лекар не е препоръчал друго, давайте ATUSIN® BABY по следната схема:

- Деца от 3 до 12 м.: 3 пъти по 5 ml на ден.*
- Деца от 1 до 5 г.: 3 пъти по 10 ml на ден.

Да не се превишава препоръчаната дневна доза.

Опаковката съдържа спринцовка, улесняваща дозирането.

* При кърмачета от 0 до 3 м. се препоръчва приемът на препаратите да започне след консултация с лекар.

IV. СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ATUSIN® BABY може да бъде вземан както самостоятелно, така и в комбинация с друг препарат, след консултация с Вашия лекар.

Прекомерната консумация може да доведе до слабителен ефект.

V. СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте ATUSIN® BABY в оригиналната опаковка при температура до 25°C, на места недостъпни за деца.

Не използвайте препарата след изтичане на годността му или ако целостта на опаковката е нарушена.

Да се употребява не по-късно от 30 дни след отваряне!